

表 4-2 沖縄県悪性新生物年齢階級別罹患数:男
 確診年:平成 18 年 性別:男

| ICD10 | 部位 | 年齢階級別罹患数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 罹患数計 | | |
|-----------------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | | 85- | |
| C00-C96,D5,D6 | 全部位 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 29 | 67 | 122 | 160 | 163 | 274 | 369 | 366 | 257 | 227 | 2,073 |
| C00-C14 | 口腔、咽頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 12 | 6 | 7 | 66 |
| C15 | 食道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 8 | 15 | 17 | 6 | 9 | 6 | 76 |
| C16 | 胃 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 16 | 26 | 21 | 35 | 43 | 39 | 34 | 29 | 29 | 259 |
| C18 | 結腸 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 4 | 11 | 25 | 20 | 47 | 48 | 32 | 22 | 16 | 16 | 255 |
| C19-C21 | 直腸および肛門 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 9 | 15 | 21 | 21 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 139 |
| C18-C20 | 大腸(再掲) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 7 | 19 | 39 | 41 | 38 | 67 | 63 | 46 | 33 | 27 | 391 |
| C22 | 肝臓 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 15 | 16 | 14 | 21 | 28 | 12 | 13 | 13 | 130 |
| C23-C24 | 胆嚢、胆管 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 12 | 15 | 11 | 19 | 19 | 82 |
| C25 | 膵臓 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 12 | 4 | 9 | 11 | 4 | 4 | 66 |
| C32 | 喉頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 9 |
| C33-C34 | 気管支、肺 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 13 | 25 | 22 | 55 | 111 | 122 | 80 | 62 | 62 | 498 |
| C43-C44 | 皮膚 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| C50,D05 | 乳房 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| C53-C55,C58,D06 | 子宮※1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C53-C55,C58 | 子宮※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C53 | 子宮頸(再掲)※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C54 | 子宮体(再掲)※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C56 | 卵巣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C61 | 前立腺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 22 | 29 | 27 | 17 | 19 | 19 | 127 |
| C67 | 膀胱 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 50 |
| C64-C66,C68 | 腎など | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 41 |
| C70-C72 | 脳、神経系 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| C73 | 甲状腺 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 10 |
| C81-C85,C96 | リンパ腫 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | - | 44 |
| C88-C90 | 骨髄腫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| C91-C95 | 白血病 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 11 | 3 | 6 | 6 | 68 |
| C915 | ATL(再掲) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | その他 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 6 | 8 | 9 | 13 | 23 | 13 | 16 | 16 | 114 |
| | 沖縄県人口平成18年(人) | 41,834 | 43,260 | 44,206 | 45,436 | 41,469 | 45,429 | 52,997 | 45,577 | 44,279 | 46,121 | 53,553 | 44,297 | 29,669 | 31,980 | 27,578 | 17,797 | 9,393 | 7,751 | 672,626 | |
| | 世界人口(人) | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 100,000 | |
| | 昭和60年日本モデル人口(千人) | 8,180 | 8,338 | 8,497 | 8,655 | 8,814 | 8,972 | 9,130 | 9,289 | 9,400 | 8,651 | 7,616 | 6,581 | 5,546 | 4,511 | 3,476 | 2,441 | 1,406 | 784 | 120,287 | |

※1:上皮内がん含む ※2:上皮内がん除

表 4-3 沖縄県悪性新生物年齢階級別罹患数:女
 確診年:平成 18 年 性別:女

| ICD10 | 部位 | 年齢階級別罹患数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 罹患数計 | |
|-----------------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | | 85- |
| C00-C96,D5,D6 | 全部位 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 19 | 26 | 47 | 85 | 106 | 130 | 120 | 153 | 158 | 193 | 187 | 327 | 1579 |
| C00-C14 | 口腔、咽頭 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 8 | 14 |
| C15 | 食道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 8 |
| C16 | 胃 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 6 | 11 | 6 | 14 | 7 | 13 | 15 | 17 | 33 | 132 | |
| C18 | 結腸 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 28 | 22 | 51 | 207 |
| C19-C21 | 直腸および肛門 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 4 | 13 | 1 | 14 | 60 | |
| C18-C20 | 大腸(再掲) | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | 15 | 21 | 33 | 29 | 41 | 23 | 65 | 263 |
| C22 | 肝臓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 | 13 | 49 | |
| C23-C24 | 胆嚢、胆管 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 18 | 20 | 73 |
| C25 | 膵臓 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 10 | 54 | |
| C32 | 喉頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| C33-C34 | 気管支、肺 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 16 | 13 | 28 | 33 | 44 | 62 | 227 |
| C43-C44 | 皮膚 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 27 |
| C50,D05 | 乳房 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 13 | 22 | 45 | 41 | 39 | 32 | 36 | 22 | 29 | 10 | 7 | 300 |
| C53-C55,C58,D06 | 子宮※1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 14 | 72 |
| C53-C55,C58 | 子宮 ※2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 14 | 71 |
| C53 | 子宮頸(再掲)※2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 31 |
| C54 | 子宮体(再掲)※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 25 |
| C56 | 卵巣 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 6 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 32 |
| C61 | 前立腺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C67 | 膀胱 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 30 | |
| C64-C66,C68 | 腎など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| C70-C72 | 脳、神経系 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 |
| C73 | 甲状腺 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 24 |
| C81-C85,C96 | リンパ腫 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 40 |
| C88-C90 | 骨髄腫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| C91-C95 | 白血病 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 7 | 7 | 11 | 5 | 11 | 59 | |
| C915 | ATL(再掲) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | その他 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 7 | 6 | 14 | 9 | 8 | 22 | 33 | 116 |
| | 沖縄県人口平成18年(人) | 39,717 | 40,939 | 41,946 | 43,409 | 41,985 | 46,207 | 53,789 | 46,635 | 44,198 | 45,341 | 50,296 | 41,715 | 29,975 | 34,512 | 30,533 | 25,237 | 18,285 | 22,922 | 697,641 |
| | 世界人口(人) | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 100,000 |
| | 昭和60年日本モデル人口(千人) | 8,180 | 8,338 | 8,497 | 8,655 | 8,814 | 8,972 | 9,130 | 9,289 | 9,400 | 8,651 | 7,616 | 6,581 | 5,546 | 4,511 | 3,476 | 2,441 | 1,406 | 784 | 120,287 |

※1:上皮内がん含む ※2:上皮内がん除く

表 5-1 沖縄県悪性新生物年齢階級別罹患率及び年齢調整罹患率(人口10万対):男女
 確診年:平成18年 性別:男女

| ICD10 | 部位 | 年齢階級別罹患率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 粗罹患率 | | 年齢調整罹患率 | |
|-----------------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|-------|---------|--|
| | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85- | 全年齢 | 世界人口 | 日本人人口 | |
| | | 17.2 | 8.3 | 3.5 | 5.6 | 9.6 | 14.2 | 23.4 | 40.1 | 85.9 | 166.2 | 219.5 | 337.2 | 474.5 | 642.2 | 906.9 | 1,299.0 | 1,604.2 | 1,806.1 | 266.5 | 266.5 | 135.4 | |
| C00-C96,D05,D06 | 全部位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 5.8 | 3.0 | |
| C00-C14 | 口腔、咽喉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 | 6.1 | 3.3 | |
| C15 | 食道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.5 | 28.5 | 14.4 | |
| C16 | 胃 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.7 | 33.7 | 17.7 | |
| C18 | 結腸 | 2.5 | - | - | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 14.5 | 14.5 | 8.1 | |
| C19-C21 | 直腸および肛門 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.7 | 47.7 | 25.5 | |
| C18-C20 | 大腸(再掲) | 2.5 | 1.2 | - | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 13.1 | 13.1 | 6.5 | |
| C22 | 肝臓 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.3 | 11.3 | 4.7 | |
| C23-C24 | 胆嚢、胆管 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 8.8 | 4.6 | |
| C25 | 膵臓 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.3 | |
| C32 | 喉頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.9 | 52.9 | 22.2 | |
| C33-C34 | 気管支、肺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 1.2 | |
| C43-C44 | 皮膚 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.9 | 21.9 | 15.0 | |
| C50,D05 | 乳房 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | 5.3 | 3.0 | |
| C53-C55,C58,D06 | 子宮※1 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 5.2 | 3.0 | |
| C53-C55,C58 | 子宮※2 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 1.5 | |
| C63 | 子宮頸(再掲)※2 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 1.8 | 1.1 | |
| C64 | 子宮体(再掲)※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 1.5 | |
| C66 | 卵巣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 1.3 | |
| C61 | 前立腺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 9.3 | 4.0 | |
| C67 | 膀胱 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 5.8 | 2.6 | |
| C64-C66,C68 | 腎など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 2.3 | |
| C70-C72 | 脳、神経系 | - | 1.2 | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2.6 | 1.5 | |
| C73 | 甲状腺 | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 1.7 | |
| C81-C85,C96 | リンパ腫 | - | - | - | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 6.1 | 6.1 | 3.3 | |
| C88-C90 | 骨髄腫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 0.6 | |
| C91-C95 | 白血病 | 4.9 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 | 3.3 | 0.9 | - | 3.4 | 5.5 | 11.6 | 12.8 | 13.4 | 19.6 | 29.3 | 51.1 | 28.9 | 55.4 | 9.3 | 9.3 | 5.5 | |
| C915 | ATL(再掲) | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 4.4 | 2.9 | 8.1 | 8.4 | 15.0 | 20.7 | 39.5 | 14.5 | 22.8 | 5.2 | 4.6 | 6.1 | |
| | その他 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 4.8 | 4.4 | 3.7 | 2.2 | 3.4 | 6.6 | 12.5 | 15.1 | 23.5 | 34.6 | 37.9 | 72.0 | 126.5 | 159.7 | 16.8 | 16.8 | 8.6 | |
| | 沖縄県人口平成18年(人) | 81,551 | 84,199 | 86,152 | 88,845 | 83,454 | 91,636 | 106,786 | 92,212 | 88,477 | 91,462 | 103,849 | 86,012 | 59,644 | 66,492 | 58,111 | 43,034 | 27,678 | 30,673 | 1,370,267 | | | |
| | 世界人口(人) | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 100,000 | | | |
| | 昭和60年日本モデル人口(千人) | 8.180 | 8.338 | 8.497 | 8.655 | 8.814 | 8.972 | 9.130 | 9.289 | 9.400 | 8.651 | 7.616 | 6.581 | 5.546 | 4.511 | 3.476 | 2.441 | 1.406 | 784 | 120,287 | | | |

※1:上皮内がん含む ※2:上皮内がん除く

表 5-2 沖縄県悪性新生物年齢階級別罹患率及び年齢調整罹患率(人口10万対):男
 確診年:平成18年 性別:男

| ICD10 | 部位 | 年齢階級別罹患率 | | | | | | | | | | | | | | | 年齢調整罹患率 | | | | | |
|-----------------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85- | 全年齢 | 世界人口 | 日本人口 |
| C00-C96,D05,D06 | 全部位 | 19.1 | 4.6 | 4.5 | 2.2 | 4.8 | 15.4 | 11.3 | 24.1 | 65.5 | 145.3 | 227.8 | 361.2 | 549.4 | 856.8 | 1,338.0 | 2,056.5 | 2,736.1 | 2,928.7 | 308.2 | 168.9 | 245.0 |
| C00-C14 | 口腔、咽頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 10.8 | 7.5 | 13.5 | 27.0 | 28.1 | 29.0 | 67.4 | 63.9 | 90.3 | 9.8 | 5.6 | 8.0 |
| C15 | 食道 | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 8.7 | 5.6 | 15.8 | 27.0 | 46.9 | 61.6 | 33.7 | 95.8 | 77.4 | 11.3 | 6.5 | 9.1 |
| C16 | 胃 | 2.4 | - | - | - | - | - | 3.8 | 2.2 | 4.5 | 21.7 | 29.9 | 58.7 | 70.8 | 109.4 | 155.9 | 219.1 | 362.0 | 374.1 | 38.5 | 21.2 | 30.6 |
| C18 | 結腸 | 2.4 | - | - | - | - | - | 3.8 | 11.0 | 9.0 | 23.9 | 46.7 | 45.1 | 74.2 | 147.0 | 174.1 | 179.8 | 234.2 | 206.4 | 37.9 | 22.1 | 30.8 |
| C19-C21 | 直腸および肛門 | - | 2.3 | - | - | - | - | - | 4.4 | 6.8 | 19.5 | 28.0 | 47.4 | 53.9 | 65.7 | 54.4 | 78.7 | 117.1 | 141.9 | 20.7 | 12.7 | 17.2 |
| C18-C20 | 大腸(再掲) | 2.4 | 2.3 | - | - | - | - | 3.8 | 15.4 | 15.8 | 41.2 | 72.8 | 92.6 | 128.1 | 209.5 | 228.4 | 258.5 | 351.3 | 348.3 | 58.1 | 34.5 | 47.7 |
| C22 | 肝臓 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 4.3 | 11.2 | 33.9 | 53.9 | 43.8 | 76.1 | 157.3 | 127.8 | 167.7 | 19.3 | 10.8 | 15.5 |
| C23-C24 | 胆嚢、胆管 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 4.3 | 9.3 | 4.5 | 6.7 | 34.4 | 43.5 | 84.3 | 117.1 | 245.1 | 12.2 | 6.1 | 9.2 |
| C25 | 膵臓 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | 6.5 | 7.5 | 15.8 | 23.6 | 37.5 | 14.5 | 50.6 | 117.1 | 51.6 | 9.8 | 5.9 | 8.3 |
| C32 | 喉頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 6.3 | 10.9 | 5.6 | 21.3 | - | 1.3 | 0.7 | 1.1 |
| C33-C34 | 気管支、肺 | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 4.5 | 10.8 | 24.3 | 56.4 | 74.2 | 172.0 | 402.5 | 685.5 | 851.7 | 799.9 | 74.0 | 35.9 | 56.5 |
| C43-C44 | 皮膚 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 2.3 | 3.4 | 3.1 | 10.9 | 5.6 | 10.6 | 12.9 | 1.6 | 1.1 | 1.4 |
| C50,D05 | 乳房 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C53-C55,C58,D06 | 子宮※1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C53-C55,C58 | 子宮※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C53 | 子宮頸(再掲)※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C54 | 子宮体(再掲)※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C56 | 卵巣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C61 | 前立腺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 9.0 | 23.6 | 68.8 | 105.2 | 151.7 | 181.0 | 245.1 | 18.9 | 9.3 | 14.2 |
| C67 | 膀胱 | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | 3.7 | 9.0 | 13.5 | 18.8 | 29.0 | 50.6 | 63.9 | 116.1 | 7.4 | 4.0 | 5.8 |
| C64-C66,C68 | 腎など | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 4.3 | 5.6 | 2.3 | 13.5 | 9.4 | 25.4 | 28.1 | 95.8 | 77.4 | 6.1 | 3.2 | 4.9 |
| C70-C72 | 脳、神経系 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | 1.9 | 2.3 | 6.7 | 9.4 | 7.3 | 16.9 | 10.6 | 12.9 | 2.4 | 1.4 | 2.0 |
| C73 | 甲状腺 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | 6.7 | - | 7.3 | - | - | 12.9 | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
| C81-C85,C96 | リンパ腫 | - | - | - | 2.2 | 1.9 | - | - | - | - | 10.8 | 5.6 | 6.8 | 16.9 | 3.1 | 32.6 | 45.0 | 74.5 | - | 6.5 | 3.9 | 5.6 |
| C88-C90 | 骨髄腫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 2.3 | - | 6.3 | 14.5 | 5.6 | 21.3 | 12.9 | 1.8 | 0.9 | 1.3 |
| C91-C95 | 白血病 | 4.8 | - | 2.3 | - | - | 4.4 | - | - | 4.5 | 10.8 | 13.1 | 13.5 | 23.6 | 18.8 | 36.3 | 61.8 | 31.9 | 77.4 | 10.1 | 6.6 | 8.5 |
| C915 | ATL(再掲) | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 8.7 | 3.7 | 9.0 | 16.9 | 12.5 | 25.4 | 45.0 | 10.6 | 12.9 | 5.6 | 4.6 | 6.1 |
| | その他 | 2.4 | - | - | - | 4.8 | 6.6 | 1.9 | 2.2 | 6.8 | 6.5 | 22.4 | 13.5 | 27.0 | 28.1 | 47.1 | 129.2 | 138.4 | 206.4 | 16.9 | 9.8 | 13.7 |
| | 沖縄県人口平成18年(人) | 41,834 | 43,260 | 44,206 | 45,436 | 41,469 | 45,429 | 52,997 | 45,577 | 44,279 | 46,121 | 53,553 | 44,297 | 29,669 | 31,980 | 27,578 | 17,797 | 9,393 | 7,751 | 672,626 | | |
| | 世界人口(人) | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 100,000 | | |
| | 昭和60年日本モデル人口(千人) | 8.180 | 8.338 | 8.497 | 8.655 | 8.814 | 8.972 | 9.130 | 9.289 | 9.400 | 8.651 | 7.616 | 6.581 | 5.546 | 4.511 | 3.476 | 2.441 | 1.406 | 784 | 120,287 | | |

※1:上皮内がん含む ※2:上皮内がん除く

表5-3 沖縄県悪性新生物年齢階級別罹患率及び年齢調整罹患率(人口10万対):女
 確診年:平成18年 性別:女

| ICD10 | 部位 | 年齢階級別罹患率 | | | | | | | | | | | | | | | | | 年齢調整罹患率 | | | |
|-----------------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|
| | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85- | 全年齢 | 世界人口 | 日本人口 |
| | | 15.1 | 12.2 | 2.4 | 9.2 | 14.3 | 13.0 | 35.3 | 55.8 | 106.3 | 187.5 | 210.8 | 311.6 | 400.3 | 443.3 | 517.5 | 764.8 | 1022.7 | 1426.6 | 226.3 | 111.9 | 150.7 |
| C00-C96,D5,D6 | 全部位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C00-C14 | 口腔、咽頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C15 | 食道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C16 | 胃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C18 | 結腸 | 2.5 | - | - | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 5.6 | 4.3 | 9.1 | 11.0 | 17.9 | 31.2 | 60.1 | 63.7 | 85.2 | 110.9 | 120.3 | 222.5 | 29.7 | 13.7 | |
| C19-C21 | 直腸および肛門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C18-C20 | 大腸(再掲) | 2.5 | - | - | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 7.4 | 4.3 | 13.6 | 15.4 | 25.8 | 36.0 | 70.1 | 95.6 | 95.0 | 162.5 | 125.8 | 283.6 | 37.7 | 17.3 | |
| C22 | 肝臓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C23-C24 | 胆嚢、胆管 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | 6.0 | 2.4 | 13.3 | 17.4 | 26.2 | 43.6 | 98.4 | 87.3 | 10.5 | 3.7 | |
| C25 | 膵臓 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 4.4 | 4.0 | 16.8 | 10.0 | 17.4 | 29.5 | 27.7 | 38.3 | 43.6 | 7.7 | 3.5 | |
| C32 | 喉頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C33-C34 | 気管支、肺 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 11.0 | 11.9 | 40.8 | 53.4 | 37.7 | 91.7 | 130.8 | 240.6 | 270.5 | 32.5 | 12.2 | |
| C43-C44 | 皮膚 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | 2.0 | 2.4 | - | 2.9 | 3.3 | 7.9 | 27.3 | 61.1 | 3.9 | 1.1 | |
| C50,D05 | 乳房 | 2.5 | - | - | - | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 27.9 | 49.8 | 99.2 | 81.5 | 93.5 | 106.8 | 104.3 | 72.1 | 114.9 | 54.7 | 30.5 | 43.0 | 29.6 | |
| C53-C55,C58,D06 | 子宮※1 | 2.5 | - | - | - | - | 2.2 | 3.7 | 6.4 | 9.1 | 11.0 | 19.9 | 14.4 | 10.0 | 17.4 | 13.1 | 19.8 | 43.8 | 61.1 | 10.3 | 5.8 | |
| C53-C55,C58 | 子宮※2 | 2.5 | - | - | - | - | 2.2 | 3.7 | 6.4 | 9.1 | 11.0 | 19.9 | 14.4 | 10.0 | 14.5 | 13.1 | 19.8 | 43.8 | 61.1 | 10.2 | 5.7 | |
| C53 | 子宮頸(再掲)※2 | 2.5 | - | - | - | - | 2.2 | 3.7 | 6.4 | 6.8 | 4.4 | 8.0 | 4.8 | 3.3 | 5.8 | 6.6 | 4.0 | 16.4 | 17.5 | 4.4 | 3.0 | |
| C54 | 子宮体(再掲)※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 6.6 | 11.9 | 9.6 | 6.7 | 8.7 | - | 7.9 | 5.5 | 13.1 | 3.6 | 2.2 | |
| C56 | 卵巣 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 4.4 | 11.9 | - | 6.7 | 14.5 | 6.6 | 11.9 | 5.5 | 34.9 | 4.6 | 2.4 | |
| C61 | 前立腺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C67 | 膀胱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 5.8 | 9.8 | 15.8 | 27.3 | 52.4 | 4.3 | 1.4 | |
| C64-C66,C68 | 腎など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 4.0 | 2.4 | 6.7 | 8.7 | 16.4 | 31.7 | 16.4 | 8.7 | 3.9 | 1.7 | |
| C70-C72 | 脳、神経系 | - | 2.4 | - | 2.3 | - | - | - | - | - | 2.2 | 2.0 | 16.8 | - | - | 6.6 | 7.9 | 5.5 | 17.5 | 2.9 | 1.7 | |
| C73 | 甲状腺 | - | - | - | - | - | 2.2 | 1.9 | 6.4 | - | - | 6.0 | 14.4 | 13.3 | 8.7 | 3.3 | - | 5.5 | 4.4 | 3.4 | 2.5 | |
| C81-C85,C96 | リンパ腫 | - | - | - | - | 2.4 | - | 3.7 | 2.1 | - | 2.2 | 4.0 | 9.6 | 6.7 | 14.5 | 16.4 | 23.8 | 21.9 | 30.5 | 5.7 | 2.8 | |
| C88-C90 | 骨髄腫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 3.3 | 7.9 | 5.5 | 8.7 | 1.1 | 0.4 | |
| C91-C95 | 白血病 | 5.0 | 2.4 | - | - | 2.4 | 2.2 | 1.9 | - | 2.3 | - | 9.9 | 12.0 | 3.3 | 20.3 | 22.9 | 43.6 | 27.3 | 48.0 | 8.5 | 4.4 | |
| C915 | ATL(再掲) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 7.2 | - | 17.4 | 16.4 | 35.7 | 16.4 | 26.2 | 4.7 | 3.2 | |
| | その他 | 2.5 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 4.8 | 2.2 | 5.6 | 2.1 | - | 6.6 | 2.0 | 16.8 | 20.0 | 40.6 | 29.5 | 31.7 | 120.3 | 144.0 | 16.6 | 7.9 | |
| | 沖縄県人口平成18年(人) | 39,717 | 40,939 | 41,946 | 43,409 | 41,985 | 46,207 | 53,789 | 46,635 | 44,198 | 45,341 | 50,296 | 41,715 | 29,975 | 34,512 | 30,533 | 25,237 | 18,285 | 22,922 | 697,641 | | |
| | 世界人口(人) | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 100,000 | | |
| | 昭和60年日本モザル人口(千人) | 8,180 | 8,338 | 8,497 | 8,655 | 8,814 | 8,972 | 9,130 | 9,289 | 9,400 | 8,651 | 7,616 | 6,581 | 5,546 | 4,511 | 3,476 | 2,441 | 1,406 | 784 | 120,287 | | |

※1:上皮内がん含む ※2:上皮内がん除く

(6) 平成7-8年と平成17-18年の比較 その1 -主要部位別性別罹患数、割合、罹患率比較-





表6及び図4-1、図4-2は、平成17-18年と10年前の平成7-8年の各2年間の主要部位別、性別の罹患数、罹患割合、性比、罹患率を比較したものである。

表6より、罹患数、性比等をみると、平成7-8年では、乳房が368人(12.7%)であったが、平成17-18年では803人(22.8%)と増加した。また、女性を1とした場合の男の比(性比)をみると、ほとんどの部位で男性が高い結果となった(喉頭(平成7-8・10.2、平成17-18・27.0)、食道(8.0、7.5)、口腔・咽頭(3.4、3.8))。

平成7-8年の部位別罹患数を1とすると、10年後の平成17-18年は、男性の前立腺が2.2倍(138→303)、女性の乳房が2.2倍(368→803)に増加した。

表6 主要部位別・性別・および罹患割合の比

| ICD10コード | 部位 | 平成7-8年 | | | | | 平成17-18年 | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|-----------|
| | | 男(M) | | 女(F) | | 性比 M/F | 男(M) | | 女(F) | | 性比 M/F |
| | | 数 | % | 数 | % | | 数 | % | 数 | % | |
| C00-C96,D5,D6 | 全部位 | 3,437 | 100.0 | 2,909 | 100.0 | 1.2 | 4,152 | 100.0 | 3,528 | 100.0 | 1.2 |
| C00-C14 | 口腔、咽頭 | 161 | 4.7 | 48 | 1.7 | 3.4 | 160 | 3.9 | 42 | 1.2 | 3.8 |
| C15 | 食道 | 160 | 4.7 | 20 | 0.7 | 8.0 | 158 | 3.8 | 21 | 0.6 | 7.5 |
| C16 | 胃 | 456 | 13.3 | 211 | 7.3 | 2.2 | 492 | 11.8 | 232 | 6.6 | 2.1 |
| C18 | 結腸 | 337 | 9.8 | 243 | 8.4 | 1.4 | 496 | 11.9 | 437 | 12.4 | 1.1 |
| C19-C21 | 直腸 | 192 | 5.6 | 106 | 3.6 | 1.8 | 263 | 6.3 | 118 | 3.3 | 2.2 |
| C18-C20 | 大腸 | 524 | 15.2 | 346 | 11.9 | 1.5 | 754 | 18.2 | 550 | 15.6 | 1.4 |
| C22 | 肝臓 | 191 | 5.6 | 103 | 3.5 | 1.9 | 236 | 5.7 | 109 | 3.1 | 2.2 |
| C23-C24 | 胆嚢、胆管 | 85 | 2.5 | 127 | 4.4 | 0.7 | 145 | 3.5 | 138 | 3.9 | 1.1 |
| C25 | 膵臓 | 90 | 2.6 | 67 | 2.3 | 1.3 | 128 | 3.1 | 111 | 3.1 | 1.2 |
| C32 | 喉頭 | 51 | 1.5 | 5 | 0.2 | 10.2 | 27 | 0.7 | 1 | 0.0 | 27.0 |
| C33-C34 | 気管支、肺 | 789 | 23.0 | 322 | 11.1 | 2.5 | 977 | 23.5 | 447 | 12.7 | 2.2 |
| C43-C44 | 皮膚 | 70 | 2.0 | 97 | 3.3 | 0.7 | 40 | 1.0 | 67 | 1.9 | 0.6 |
| C50,D05 | 乳房 | 5 | 0.1 | 368 | 12.7 | ・ | 2 | 0.0 | 803 | 22.8 | ・ |
| C53-C55,C58,D06 | 子宮 | - | - | 450 | 15.5 | - | - | - | 284 | 8.0 | - |
| C56 | 卵巣 | - | - | 77 | 2.6 | - | - | - | 62 | 1.8 | - |
| C61 | 前立腺 | 138 | 4.0 | - | - | - | 303 | 7.3 | - | - | - |
| C67 | 膀胱 | 71 | 2.1 | 34 | 1.2 | 2.1 | 93 | 2.2 | 60 | 1.7 | 1.6 |
| C64-C66,C68 | 腎など | 83 | 2.4 | 51 | 1.8 | 1.6 | 76 | 1.8 | 53 | 1.5 | 1.4 |
| C70-C72 | 脳、神経系 | 48 | 1.4 | 58 | 2.0 | 0.8 | 44 | 1.1 | 47 | 1.3 | 0.9 |
| C73 | 甲状腺 | 11 | 0.3 | 87 | 3.0 | 0.1 | 24 | 0.6 | 61 | 1.7 | 0.4 |
| C81-C85,C96 | リンパ腫 | 106 | 3.1 | 78 | 2.7 | 1.4 | 95 | 2.3 | 88 | 2.5 | 1.1 |
| C88-C90 | 骨髄腫 | 26 | 0.8 | 25 | 0.9 | 1.0 | 26 | 0.6 | 23 | 0.7 | 1.1 |
| C91-C95 | 白血病 | 138 | 4.0 | 119 | 4.1 | 1.2 | 141 | 3.4 | 116 | 3.3 | 1.2 |
| | その他 | 229 | 6.7 | 213 | 7.3 | 1.1 | 226 | 5.4 | 208 | 5.9 | 1.1 |



平成7-8年

| 男 | 人数 | % |
|-------|-------|-------|
| 気管支、肺 | 789 | 23.0 |
| 大腸 | 524 | 15.2 |
| 胃 | 456 | 13.3 |
| 肝臓 | 191 | 5.6 |
| 口腔、咽頭 | 161 | 4.7 |
| 食道 | 160 | 4.7 |
| 前立腺 | 138 | 4.0 |
| 白血病 | 138 | 4.0 |
| リンパ腫 | 106 | 3.1 |
| 膵臓 | 90 | 2.6 |
| 胆嚢、胆管 | 85 | 2.5 |
| その他 | 599 | 17.4 |
| 合計 | 3,437 | 100.0 |

平成17-18年

| 男 | 人数 | % |
|-------|-------|-------|
| 気管支、肺 | 977 | 23.5 |
| 大腸 | 754 | 18.2 |
| 胃 | 492 | 11.8 |
| 前立腺 | 303 | 7.3 |
| 肝臓 | 236 | 5.7 |
| 口腔、咽頭 | 160 | 3.9 |
| 食道 | 158 | 3.8 |
| 胆嚢、胆管 | 145 | 3.5 |
| 白血病 | 141 | 3.4 |
| 膵臓 | 128 | 3.1 |
| リンパ腫 | 95 | 2.3 |
| その他 | 563 | 13.6 |
| 合計 | 4,152 | 100.0 |

平成7-8年

| 女 | 人数 | % |
|-------|-------|-------|
| 子宮 | 450 | 15.5 |
| 乳房 | 368 | 12.7 |
| 大腸 | 346 | 11.9 |
| 気管支、肺 | 322 | 11.1 |
| 胃 | 211 | 7.3 |
| 胆嚢、胆管 | 127 | 4.4 |
| 白血病 | 119 | 4.1 |
| 肝臓 | 103 | 3.5 |
| 皮膚 | 97 | 3.3 |
| 甲状腺 | 87 | 3.0 |
| リンパ腫 | 78 | 2.7 |
| その他 | 601 | 20.7 |
| 合計 | 2,909 | 100.0 |

平成17-18年

| 女 | 人数 | % |
|-------|-------|-------|
| 乳房 | 803 | 22.8 |
| 大腸 | 550 | 15.6 |
| 気管支、肺 | 447 | 12.7 |
| 子宮 | 284 | 8.0 |
| 胃 | 232 | 6.6 |
| 胆嚢、胆管 | 138 | 3.9 |
| 白血病 | 116 | 3.3 |
| 膵臓 | 111 | 3.1 |
| 肝臓 | 109 | 3.1 |
| リンパ腫 | 88 | 2.5 |
| 皮膚 | 67 | 1.9 |
| その他 | 583 | 16.5 |
| 合計 | 3,528 | 100.0 |

図 4-1 部位別罹患割合の比較

図 4-1 より、部位別、男女別の罹患割合をみると、男性では、罹患率1位(気管支・肺)、2 位(大腸)、3 位(胃)は17-18年、7-8年とも同じであった。女性では、平成7-8年の罹患1位~3位は子宮、乳房、大腸であったが、平成17-18年は乳房、大腸、気管支・肺となった。

図 4-2 より、部位別男女別の罹患率をみると、平成7-8年と比較して、男性では前立腺、女性では乳房の増加がグラフ上でも目立つ結果となった。




図 4-2 部位別罹患率男女比較(平成 17-18 年・平成 7-8 年平均)(人口 10 万対)

(7) 平成 7-8 年と平成 17-18 年の比較 その2 -主要部位別性別年齢階級別罹患率-
 (7)-1) (全部位、口腔・咽頭、食道、胃、結腸、直腸)

平成 17-18 年と、平成 7-8 年の年齢階級別罹患率を部位別、性別に比較した(図 5)。

全部位男性では、17-18 年が 6-7 年より概ね低い値を示した。

全部位女性では、70-84 歳で 17-18 年は低い値を示し、他の年齢階級では 7-8 年と類似した値となった。

口腔・咽頭の男女及び食道の男性は、平成 7-8 年よりやや低い値となった。

結腸、直腸については、男女とも平成 7-8 年より上回る値を示し、特に結腸について差が顕著であった。




図 5-1 部位別年齢階級別罹患率比較 -平成 17-18 年、平成 7-8 年-
 (人口 10 万対 全部位、口腔・咽頭、食道、胃、結腸、直腸)

(7)-2) -肝臓、胆嚢・胆管、膵臓、喉頭、気管支・肺、皮膚-

肝臓については、男性は、平成7-8年が65歳代～80歳代について平成17-18年より高い値を示すものの、全年齢では平成17-18年が平成7-8年より高い値を示した。女性は、平成17-18年は、概ね平成7-8年と同様であった。

気管支・肺については、男女とも、50～70代までは平成7-8年が平成17-18年よりも高い値であったが、80代以降においては平成17-18年が高い値を示し、全年齢では平成17-18年が(平成7-8年より)高い値となった。




図5-2 部位別年齢階級別罹患率比較 -平成17-18年、平成7-8年-
(人口10万対 肝臓、胆嚢・胆管、膵臓、咽頭、気管支・肺、皮膚)

(7)-3) 前立腺、乳房、子宮(上皮内含む、除く)、子宮頸部、子宮体部-

前立腺については、85歳以上を除いて平成7-8年より増加した値を示し、全年齢では平成17-18年は、平成7-8年より約2倍の値となった。

乳房については、平成7-8年と比較して顕著に増加し、平成17-18年は(平成7-8年より)2倍以上上回る値となった。




図5-3 部位別年齢階級別罹患率比較 -平成17-18年、平成7-8年-
(人口10万対 前立腺、乳房、子宮(上皮内含む、除く)、子宮頸、子宮体)

(7)-4) -卵巣、腎など、膀胱、脳神経系、甲状腺、リンパ腫-

腎などについては、男女とも75歳以上で平成7-8年より上回る値であったが、全年齢では(平成7-8年より)やや低い値を示した。

脳神経系については、男女とも平成7-8年よりやや低い値を示した。




図5-4 部位別年齢階級別罹患率比較 -平成17-18年、平成7-8年-
(人口10万対 卵巣、腎など、膀胱、脳神経系、甲状腺、リンパ腫)

(7)-5) 一骨髓腫、白血病-

骨髓腫及び白血病については、男女とも平成 17-18 年は、平成 7-8 年をやや下回る結果となった。




図5-5 部位別年齢階級別罹患率比較 -平成 17-18 年、平成 7-8 年-
(人口 10 万対 骨髓腫、白血病)

(8) 年齢階級別罹患率および年齢調整罹患率(人口 10 万対) 沖縄県全国性別比較

全部位の罹患率を年齢階級別、性別で比較すると(沖縄県平成 16-18 年平均、全国平成 16 年)、本県は、概ね、全国を下回る値を示した。

部位別年齢調整罹患率 沖縄県(平成 18 年)と全国比較(平成 16 年)

部位別の年齢調整罹患率の比較では、胃、大腸、肝臓において、本県と全国との差が顕著(全国が高い)に出ている結果となった。気管支・肺、乳房については全国とほぼ同程度の値となった。白血病では、全国より本県の値が高い結果となった。




図 6-1 年齢階級別罹患率(全部位)比較(沖縄県:平成 16-18 年平均、全国:平成 16 年)(人口 10 万対)




図 6-2 部位別、性別年齢調整罹患率比較 (沖縄県:平成 18 年、全国:平成 16 年)(人口 10 万対、1985 年日本モデル人口)

※1 年齢階級別罹患率(全部位)比較については、沖縄県は平成 16-18 年平均値、全国は平成 16 年の値を用いた。

※2 部位別、性別年齢調整罹患率比較については、沖縄県は平成 18 年の値、全国は平成 18 年の値を用いた。

(9) 年齢調整罹患率の年次推移

本県男性の、全部位における年齢調整罹患率(人口10万対、基準人口:日本人口)は、平成18年は245.0で、全国値(平成16年推計値)の400.4に比べて低い値であった。各部位別に本県(平成18年)と全国値(平成16年)を比較すると、胃(本県:30.6、全国:79.6)、結腸(本県:30.8、全国:38.1、直腸及び肛門(本県:17.2、全国:23.6)、肝臓(本県:15.5、全国:30.2)等において、本県は低い値となった。

白血病(本県:8.5、全国:6.5)については、本県が高い値となった。

表 7-1 年齢調整罹患率の年次推移(男)

基準人口:世界人口

| ICD10コード ¹ | 部位 | 平成 | | | | | | | | | | 全国 平成16年 |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | | |
| C00-C96,D05,D06 | 全部位 | 177.2 | 181.1 | 193.5 | 175.1 | 206.8 | 196.4 | 184.9 | 177.5 | 168.9 | 282.3 | |
| C00-C14 | 口腔、咽頭 | 7.3 | 7.6 | 10.3 | 8.8 | 11.0 | 11.2 | 6.6 | 8.0 | 5.6 | 6.0 | |
| C15 | 食道 | 11.6 | 9.5 | 10.8 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 9.0 | 6.8 | 6.5 | 11.8 | |
| C16 | 胃 | 22.9 | 23.7 | 20.8 | 19.9 | 20.3 | 22.7 | 23.0 | 20.0 | 21.2 | 56.4 | |
| C18 | 結腸 | 15.5 | 15.3 | 14.5 | 18.0 | 20.4 | 18.1 | 16.5 | 21.3 | 22.1 | 26.7 | |
| C19-C21 | 直腸および肛門 | 7.5 | 7.0 | 11.5 | 10.0 | 15.1 | 11.3 | 11.0 | 11.1 | 12.7 | 17.1 | |
| C18-C20 | 大腸(再掲) | 23.0 | 22.3 | 25.9 | 28.0 | 35.1 | 29.4 | 27.4 | 32.1 | 34.5 | 43.8 | |
| C22 | 肝臓 | 9.8 | 10.9 | 11.6 | 8.2 | 12.0 | 10.9 | 8.5 | 9.4 | 10.8 | 21.5 | |
| C23-C24 | 胆嚢、胆管 | 4.9 | 5.0 | 6.3 | 4.4 | 6.5 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 6.1 | 6.3 | |
| C25 | 膵臓 | 5.2 | 5.4 | 6.1 | 4.2 | 5.6 | 6.6 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 9.6 | |
| C32 | 喉頭 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 2.5 | |
| C33-C34 | 気管支、肺 | 45.8 | 41.7 | 43.3 | 41.5 | 40.9 | 39.3 | 38.1 | 37.7 | 35.9 | 38.9 | |
| C43-C44 | 皮膚 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 3.2 | |
| C50,D05 | 乳房 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 | - | * | |
| C53-C55,C58,D06 | 子宮※1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C53-C55,C58 | 子宮※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C53 | 子宮頸(再掲)※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C54 | 子宮体(再掲)※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C56 | 卵巣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C61 | 前立腺 | 7.4 | 11.3 | 11.1 | 11.7 | 15.0 | 16.3 | 13.8 | 14.2 | 9.3 | 26.6 | |
| C67 | 膀胱 | 3.2 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 5.7 | 2.8 | 5.1 | 3.4 | 4.0 | 8.6 | |
| C64-C66,C68 | 腎、尿管等 | 2.9 | 3.3 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 3.1 | 3.2 | 7.5 | |
| C70-C72 | 脳、神経系 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 1.4 | 2.6 | |
| C73 | 甲状腺 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | |
| C81-C85,C96 | リンパ腫 | 4.6 | 5.1 | 7.1 | 4.8 | 6.6 | 6.8 | 6.0 | 4.8 | 3.9 | 8.0 | |
| C88-C90 | 骨髄腫 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | |
| C91-C95 | 白血病 | 6.2 | 9.8 | 8.0 | 7.4 | 8.9 | 10.1 | 9.5 | 7.2 | 6.6 | 5.3 | |
| C915 | 成人T細胞性白血病(再掲) | 3.0 | 5.9 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | * | |

※1: 上皮内がん含む ※2: 上皮内がん除く

基準人口:日本人口

| ICD10コード ¹ | 部位 | 平成 | | | | | | | | | | 全国 平成16年 |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | | |
| C00-C96,D05,D06 | 全部位 | 254.7 | 261.1 | 278.8 | 249.7 | 295.7 | 278.3 | 265.0 | 253.0 | 245.0 | 400.4 | |
| C00-C14 | 口腔、咽頭 | 10.3 | 10.6 | 14.4 | 12.5 | 15.4 | 15.0 | 9.1 | 11.9 | 8.0 | 8.1 | |
| C15 | 食道 | 16.6 | 13.5 | 15.3 | 10.3 | 10.8 | 13.0 | 12.8 | 10.0 | 9.1 | 16.4 | |
| C16 | 胃 | 32.7 | 34.7 | 30.5 | 29.2 | 29.7 | 32.4 | 32.5 | 28.8 | 30.6 | 79.6 | |
| C18 | 結腸 | 22.1 | 22.5 | 20.3 | 25.3 | 28.6 | 25.2 | 23.2 | 29.4 | 30.8 | 38.1 | |
| C19-C21 | 直腸および肛門 | 10.1 | 9.8 | 15.8 | 13.3 | 20.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 17.2 | 23.6 | |
| C18-C20 | 大腸(再掲) | 32.3 | 32.1 | 35.7 | 38.6 | 48.3 | 40.5 | 38.3 | 44.6 | 47.7 | 61.7 | |
| C22 | 肝臓 | 13.6 | 15.5 | 16.6 | 11.6 | 17.3 | 15.6 | 12.4 | 13.0 | 15.5 | 30.2 | |
| C23-C24 | 胆嚢、胆管 | 7.2 | 7.1 | 9.4 | 6.8 | 9.9 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 9.2 | 9.4 | |
| C25 | 膵臓 | 7.3 | 8.0 | 8.6 | 6.2 | 8.3 | 9.8 | 7.0 | 7.2 | 8.3 | 13.9 | |
| C32 | 喉頭 | 4.1 | 2.9 | 4.3 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 3.4 | |
| C33-C34 | 気管支、肺 | 69.2 | 62.1 | 67.3 | 62.1 | 62.4 | 59.6 | 59.0 | 56.7 | 56.5 | 58.1 | |
| C43-C44 | 皮膚 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 4.0 | 4.4 | 2.6 | 3.8 | 3.5 | 1.4 | 4.6 | |
| C50,D05 | 乳房 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | - | * | |
| C53-C55,C58,D06 | 子宮※1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C53-C55,C58 | 子宮※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C53 | 子宮頸(再掲)※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C54 | 子宮体(再掲)※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C56 | 卵巣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C61 | 前立腺 | 12.0 | 18.1 | 17.1 | 18.3 | 22.6 | 24.2 | 21.7 | 20.8 | 14.2 | 39.7 | |
| C67 | 膀胱 | 4.9 | 7.1 | 7.3 | 5.7 | 8.7 | 4.3 | 7.4 | 4.8 | 5.8 | 12.6 | |
| C64-C66,C68 | 腎、尿管等 | 4.2 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 4.2 | 4.9 | 10.5 | |
| C70-C72 | 脳、神経系 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 2.0 | 3.1 | |
| C73 | 甲状腺 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 2.4 | |
| C81-C85,C96 | リンパ腫 | 6.6 | 6.9 | 9.7 | 7.1 | 8.4 | 8.9 | 7.9 | 6.3 | 5.6 | 10.8 | |
| C88-C90 | 骨髄腫 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 2.8 | |
| C91-C95 | 白血病 | 8.6 | 13.6 | 10.3 | 9.6 | 11.7 | 11.8 | 11.4 | 9.6 | 8.5 | 6.5 | |
| C915 | 成人T細胞性白血病(再掲) | 8.6 | 7.3 | 5.6 | 5.1 | 6.3 | 6.2 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | * | |

※1: 上皮内がん含む ※2: 上皮内がん除く

本県女性の、全部位における年齢調整罹患率(人口10万対、基準人口:日本人口)は、平成18年では150.7で、全国値(平成16年)の266.2に比べて低い値であった。本県(平成18年)と全国値(平成16年)を比較すると、胃(本県:12.3、全国:30.2)、直腸及び肛門(本県:5.5、全国:10.7)、肝臓(本県:4.0、全国:10.3)等に本県は低い値であった。

白血病(本県:5.5、全国:3.9)は全国より高い値となった

表7-2 年齢調整罹患率の年次推移(女)

基準人口:世界人口

| ICD10コード* | 部位 | 平成 | | | | | | | | | | 全国 |
|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 平成16年 | |
| C00-C96,D05,D06 | 全部位 | 110.7 | 108.9 | 134.4 | 132.0 | 149.7 | 154.3 | 139.5 | 153.2 | 111.9 | 198.7 | |
| C00-C14 | 口腔、咽頭 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.9 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 0.7 | 2.1 | |
| C15 | 食道 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | |
| C16 | 胃 | 7.1 | 7.6 | 8.9 | 6.6 | 8.7 | 8.0 | 8.3 | 6.7 | 9.0 | 21.5 | |
| C18 | 結腸 | 8.2 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 12.4 | 11.5 | 12.6 | 14.7 | 13.7 | 16.9 | |
| C19-C21 | 直腸および肛門 | 3.4 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 4.0 | 7.8 | |
| C18-C20 | 大腸(再掲) | 11.5 | 12.9 | 14.4 | 14.0 | 16.7 | 15.2 | 15.8 | 18.5 | 17.3 | 24.7 | |
| C22 | 肝臓 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 7.1 | |
| C23-C24 | 胆嚢、胆管 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 4.7 | |
| C25 | 膵臓 | 2.8 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 5.1 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 5.7 | |
| C32 | 喉頭 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | |
| C33-C34 | 気管支、肺 | 12.7 | 13.8 | 11.7 | 11.4 | 12.3 | 12.6 | 12.1 | 12.0 | 12.2 | 13.7 | |
| C43-C44 | 皮膚 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | |
| C50,D05 | 乳房 | 15.7 | 13.7 | 31.3 | 30.8 | 32.9 | 40.3 | 41.6 | 49.9 | 29.6 | 48.1 | |
| C53-C55,C58,D06 | 子宮※1 | 20.1 | 13.9 | 21.6 | 23.7 | 26.1 | 22.7 | 15.4 | 21.4 | 5.8 | 26.0 | |
| C53-C55,C58 | 子宮※2 | 15.8 | 10.1 | 16.4 | 16.6 | 18.1 | 16.6 | 11.8 | 18.7 | 5.7 | 16.6 | |
| C53 | 子宮頸(再掲)※2 | 9.8 | 6.0 | 9.6 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | 7.4 | 11.9 | 3.0 | 9.5 | |
| C54 | 子宮体(再掲)※2 | 5.1 | 3.1 | 6.2 | 5.1 | 7.0 | 5.0 | 3.8 | 6.4 | 2.2 | 6.5 | |
| C56 | 卵巣 | 4.6 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 8.1 | |
| C61 | 前立腺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C67 | 膀胱 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | |
| C64-C66,C68 | 腎、尿管等 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | |
| C70-C72 | 脳、神経系 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 3.4 | 1.7 | 2.1 | |
| C73 | 甲状腺 | 3.7 | 4.0 | 3.0 | 1.4 | 3.0 | 3.8 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 6.8 | |
| C81-C85,C96 | リンパ腫 | 4.1 | 3.2 | 4.2 | 2.6 | 4.7 | 4.7 | 3.0 | 3.8 | 2.8 | 5.8 | |
| C88-C90 | 骨髄腫 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | |
| C91-C95 | 白血病 | 3.4 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 4.4 | 3.3 | |
| C951 | 成人T細胞性白血病(再掲) | 3.5 | 2.9 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | * | |

※1:上皮内がん含む ※2:上皮内がん除く

基準人口:日本人口

| ICD10コード* | 部位 | 平成 | | | | | | | | | | 全国 |
|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 平成16年 | |
| C00-C96,D05,D06 | 全部位 | 150.1 | 147.6 | 181.2 | 177.1 | 199.5 | 204.5 | 185.7 | 202.8 | 150.7 | 266.2 | |
| C00-C14 | 口腔、咽頭 | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 4.0 | 4.5 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 0.9 | 2.8 | |
| C15 | 食道 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | |
| C16 | 胃 | 9.9 | 10.8 | 12.7 | 9.2 | 11.9 | 11.2 | 11.3 | 8.9 | 12.3 | 30.2 | |
| C18 | 結腸 | 12.0 | 13.1 | 13.3 | 14.3 | 17.3 | 16.2 | 17.2 | 20.6 | 18.5 | 23.8 | |
| C19-C21 | 直腸および肛門 | 4.6 | 4.9 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.2 | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 10.7 | |
| C18-C20 | 大腸(再掲) | 16.5 | 17.8 | 19.8 | 19.8 | 23.1 | 21.2 | 21.4 | 25.9 | 23.5 | 34.5 | |
| C22 | 肝臓 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 4.6 | 6.2 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 10.3 | |
| C23-C24 | 胆嚢、胆管 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 7.0 | |
| C25 | 膵臓 | 4.0 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | 6.0 | 7.4 | 5.3 | 4.4 | 4.9 | 8.4 | |
| C32 | 喉頭 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | |
| C33-C34 | 気管支、肺 | 18.3 | 19.9 | 17.6 | 16.5 | 18.2 | 18.4 | 17.7 | 17.6 | 18.0 | 19.5 | |
| C43-C44 | 皮膚 | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 3.0 | 1.7 | 3.2 | |
| C50,D05 | 乳房 | 20.3 | 18.0 | 40.5 | 39.9 | 42.2 | 51.3 | 53.9 | 64.4 | 38.2 | 62.0 | |
| C53-C55,C58,D06 | 子宮※1 | 25.8 | 18.0 | 27.4 | 30.0 | 32.9 | 28.6 | 19.2 | 27.6 | 7.5 | 32.6 | |
| C53-C55,C58 | 子宮※2 | 20.5 | 13.3 | 21.1 | 21.2 | 23.1 | 21.2 | 15.1 | 24.2 | 7.4 | 21.4 | |
| C53 | 子宮頸(再掲)※2 | 12.5 | 8.1 | 12.5 | 14.4 | 13.4 | 14.1 | 9.3 | 15.2 | 3.7 | 12.2 | |
| C54 | 子宮体(再掲)※2 | 6.7 | 3.9 | 7.7 | 6.5 | 8.9 | 6.4 | 5.0 | 8.3 | 2.9 | 8.4 | |
| C56 | 卵巣 | 6.0 | 3.8 | 5.1 | 6.2 | 7.1 | 6.0 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 10.3 | |
| C61 | 前立腺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C67 | 膀胱 | 1.0 | 1.2 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | |
| C64-C66,C68 | 腎、尿管等 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 3.0 | 2.2 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 3.8 | |
| C70-C72 | 脳、神経系 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 3.6 | 2.1 | 2.4 | |
| C73 | 甲状腺 | 4.7 | 5.1 | 3.9 | 1.8 | 3.9 | 4.8 | 3.3 | 4.9 | 3.1 | 8.5 | |
| C81-C85,C96 | リンパ腫 | 5.2 | 4.6 | 5.8 | 3.5 | 6.2 | 5.8 | 3.9 | 5.0 | 3.8 | 7.6 | |
| C88-C90 | 骨髄腫 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | |
| C91-C95 | 白血病 | 4.4 | 8.5 | 6.8 | 6.5 | 8.9 | 8.1 | 7.6 | 6.5 | 5.5 | 3.9 | |
| C951 | 成人T細胞性白血病(再掲) | 4.9 | 4.1 | 2.7 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | * | |

※1:上皮内がん含む ※2:上皮内がん除く

(10) 主要部位における年齢調整罹患率、年齢調整死亡率の年次推移及び年齢階級別罹患率、年齢階級別死亡率(沖縄県、全国比較)

(10)-1 全部位

全部位の年齢調整罹患率年次推移では、本県男性はやや減少傾向を呈した。女性は、前年より減少した。年齢調整死亡率年次推移では、全国値よりやや下回る値で推移した。年齢階級別罹患率では、本県男女とも全国より低い値で推移した。年齢階級別死亡率では、本県男性は高齢層において全国をわずかに上回る値となった。以下、他部位の状況については、以降のとおり。




図 7-1 年齢調整罹患率年次推移、年齢調整死亡率年次推移、年齢階級別罹患率、年齢階級別死亡率 沖縄県、全国比較 全部位(人口 10 万対)

- ※1 年齢階級別罹患率については、沖縄県は平成 16-18 年の平均値を用いた。全国は平成 16 年の値を用いた。
- ※2 年齢調整罹患率、死亡率については、1985 年日本モデル人口を用いた。
- ※3 年齢調整死亡率年次推移については、75 歳未満の値を用いた。
- ※4 年齢階級別死亡率については、沖縄県、全国とも平成 18 年の値を用いた。