

中部保健所管内 感染症発生動向調査情報(月報)

11月

2023/11/1 ~ 2023/11/30

1. 患者報告数

疾病名	総数		男		女	
	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県
性器クラミジア	10	36	1	4	9	32
性器ヘルペスウイルス	1	4	0	0	1	4
尖圭コンジローム	0	4	0	1	0	3
淋菌	1	10	0	3	1	7

2. 定点あたり報告数

疾病名	中部	沖縄県	全国
性器クラミジア	2.5	3	2.59
性器ヘルペスウイルス	0.25	0.33	0.81
尖圭コンジローム	0	0.33	0.54
淋菌	0.25	0.83	0.84

※中部保健所管内 STD定点医療機関内訳

- ・泌尿器科・・・2医療機関
- ・産婦人科・・・2医療機関

計:4医療機関



※「定点あたり報告数」とは・・・1医療機関あたりの平均患者報告数



※年齢別報告数や過去5年間の報告数の推移等は、「沖縄県感染症情報センター ホームページ」に掲載しています。

詳しくは[こちら\(沖縄県感染症情報センター\)](#)をご覧ください。

【 3. 性感染症の主な症状について 】

疾患名	主な症状
性器クラミジア	(男性) 排尿痛、尿道不快感、かゆみなどの症状がみられる。 (女性) 自覚症状に乏しいことが多い。子宮頸管炎、不妊などにつながることもある。
性器ヘルペス	外陰部の不快感、かゆみ等の症状の後、発熱、全身倦怠感、リンパ節の腫れ、強い痛み等を伴って、潰瘍や水疱が出現する。女性では排尿困難や歩行困難のため、入院加療を余儀なくされることもある。一度感染すると、ウイルスが潜伏し、再発することが多い。
尖圭コンジローム	性器・肛門周辺にとがったイボのようなものができ、おりものの増加やかゆみ、痛みを伴うことがある。
淋菌	(男性) 急性尿道炎として発症し、膿などの分泌物や排尿時の痛みを伴う。 (女性) 子宮頸管炎として発症するが、自覚症状のない場合が多い。不妊につながることもある。

※気になる症状がある場合は、医療機関(男性は泌尿器科・女性は産婦人科)へご相談ください。