

平成19年度病害虫発生予報第9号(12月予報)

＜お知らせ＞ トマト黄化葉巻病の防除対策に関するお知らせがあります(裏表紙参照)。

今月のトピックス

<http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=119>



ハダニ類と土着天敵の仲間 (野菜類・花き類・果樹類)

＜害虫＞ ハダニ類

＜土着天敵＞

キアシクロヒメテントウ *Stethorus japonicus*

ヒメハダニカブリケシハネカクシ *Oligota kashmirica benefica*

ハダニタマバエ *Feltiella* sp.

ケナガカブリダニ *Amblyseius womersleyi*



スイカ葉上のコロニー



生態と被害



ハダニ類は多くの作物を加害し、野菜類ではナミハダニやカンザワハダニが代表的な種であるが、果樹類では作物ごとに種が異なる場合が多い。体長は、雌成虫で約0.4-0.5mm、雄成虫は約0.3-0.4mmである。成虫や幼虫が葉や果実をカスリ状に加害し、収量・品質に影響を与える。また、高密度時にコロニーを形成した後分散する。ハダニ類の土着天敵は県内に広く分布し種類も多く利用価値が高い。ハダニ類は、薬剤抵抗性を発達させやすいので、天敵に影響の少ない選択性殺虫剤を主体とした防除体系を作ることがポイントである。

☆ 予報の見方 ☆

- 1) 発生予察情報は、前月の調査に基づき発生程度が「並」以上の病害虫を中心に掲載しています。「やや少」以下の病害虫については通常掲載していません。
- 2) 「発生程度」は平年との比較を示しています。そのため、毎年その月で高い数値が続いた場合には、その月の「発生程度」は密度が高くて「並」として発表されます。前月との多少の比較はグラフを参考にしてください。