

令和3年度 沖縄群島 病害虫発生予報 第9号(12月予報)

○向こう1か月の天候の見通し(令和3年11月25日発表:沖縄気象台)

平均気温	降水量	日照時間
低い	少ない	平年並か少ない

○12月の発生予報 (沖縄群島)

作物	病害虫名	調査結果	予報		予報の根拠
		11月の発生量 (平年比)	11月からの 増減	12月の発生量 (平年比)	
さとうきび	① メイチュウ類 (カンシャシクイハマキ、イネヨトウ)	並	↗	並	芯枯莖率の平年の発生量の推移(↗)
かんきつ(温州みかん)	① ハダニ類	やや多	→	やや多	平年の発生量の推移(→)
かんきつ(タンカ)	① ハダニ類	並	↗	並	平年の発生量の推移(↗)
マンゴー	① ハダニ類	並	↘	並	平年の発生量の推移(↘)
キャベツ	① コナガ	並	↗	並	平年の発生量の推移(↗)
	② ウワバ類	(発生なし)並	↗	並	平年の発生量の推移(↗)
レタス	① クロゲハナアザミウマ	(発生なし)並	↗	並	平年の発生量の推移(↗)
施設野菜(ゴーヤ)	① うどんこ病	並	→	並	平年の発生量の推移(→)
	② ミナミキイロアザミウマ	並	↗	並	平年の発生量の推移(↗)
	③ タバココナジラミ	並	↘	並	平年の発生量の推移(↘)
	④ アブラムシ類	並	↗	並	平年の発生量の推移(↗)

※発生量は、ほ場調査の結果の平年値または例年値の同月比。

- 平年値: 過去5~10年間の発生量の平均値
- 例年値: 過去3~4年間の発生量の平均値

※(発生なし)は、今回の調査中に観察することができなかった病害虫。

※増減傾向は、発生量(現況)と比較した翌月の増減を予測している。



沖縄県病害虫防除技術センターのホームページにて、発生予察の詳細内容やその他情報を掲載しています。

○12月の発生予報つき（沖縄群島）

作物	病害虫名	調査結果	予報		予報の根拠
		11月の発生量 (平年比)	11月からの 増減	12月の発生量 (平年比)	その他、気象要因等あれば記載
（ピ ー 施 設 ） マ ン	① ミナミキイロアザミウマ	並	↓	並	平年の発生量の推移（↓）
	② タバココナジラミ	並	↓	並	平年の発生量の推移（↓）
（ト マ ト ） ト	① 黄化葉巻病	並	→	並	平年の発生量の推移（→）
	② コナジラミ類	並	↗	並	平年の発生量の推移（↗）
さ （ や 平 い 張 ） げ ん	① タバココナジラミ	並	↓	並	平年の発生量の推移（↓）
	② ミナミキイロアザミウマ	並	↗	並	平年の発生量の推移（↗）

※発生量は、ほ場調査の結果の平年値または例年値の同月比。

- 平年値：過去5～10年間の発生量の平均値
- 例年値：過去3～4年間の発生量の平均値

※（発生なし）は、今回の調査中に観察することができなかった病害虫。

※増減傾向は、発生量（現況）と比較した翌月の増減を予測している。



沖縄県病害虫防除技術センターのホームページにて、発生予察の詳細内容やその他情報を掲載しています。

○12月のその他注意すべき病害虫（沖縄群島）

作物	病害虫名	発生状況及び防除事項
マ ン ゴ ー	炭そ病・軸腐病・すす点病	せん定枝や残さは感染源となるのでほ場外へ持ち出し処分する。
	キクイムシ類	衰弱した枝、幹などから食入し、被害が進むと枯死させる。葉が黄化落葉したり、枝などから線香状の木くず（フラス）が見られたら、侵入部位まで枝を除去し、速やかに施設外に持ち出し処分する。また樹勢が低下することで本虫の加害を受けやすくなるので、樹勢維持に努める。

令和3年度 宮古群島 病害虫発生予報 第9号(12月予報)

○向こう1か月の天候の見通し(令和3年11月25日発表:沖縄気象台)

平均気温	降水量	日照時間
低い	少ない	平年並か少ない

○12月の発生予報 (宮古群島)

作物	病害虫名	調査結果	予報		予報の根拠
		11月の発生量 (平年比)	11月からの 増減	12月の発生量 (平年比)	
さとうきび	① アオドウガネ	並	↓	並	平年の発生量の推移(↓)
	② メイナユヅ類 (カンシャシクイハマキ、 イネコトウ)	並	↑	並	芯枯茎率の平年の発生量の推移(↑)
マンゴー	① ハダニ類	並	→	並	平年の発生量の推移(→)

※発生量は、ほ場調査の結果の平年値または例年値の同月比。

- 平年値：過去5～10年間の発生量の平均値
- 例年値：過去3～4年間の発生量の平均値

※(発生なし)は、今回の調査中に観察することができなかった病害虫。

※増減傾向は、発生量(現況)と比較した翌月の増減を予測している。



沖縄県病害虫防除技術センターのホームページにて、発生予察の詳細内容やその他情報を掲載しています。

○12月のその他注意すべき病害虫(宮古群島)

作物	病害虫名	発生状況及び防除事項
マンゴー	炭そ病・軸腐病・すす点病	せん定枝や残さは感染源となるのでほ場外へ持ち出し処分する。

令和3年度 八重山群島 病害虫発生予報 第9号(12月予報)

○向こう1か月の天候の見通し（令和3年11月25日発表：沖縄気象台）

平均気温	降水量	日照時間
低い	少ない	平年並か少ない

○12月の発生予報（八重山群島）

作物	病害虫名	調査結果	予報		予報の根拠
		11月の発生量 (平年比)	11月からの 増減	12月の発生量 (平年比)	
さとうきび	① メイチュウ類 (カンシャシクイハマキ、イネヨトウ)	並	↗	並	芯枯率率の平年の発生量の推移(↗)
マンゴー	① ハダニ類	並	↘	並	平年の発生量の推移(↘)
かぼちゃ	① アブラムシ類	多	→	多	平年の発生量の推移(→)
	② ハモグリバエ類	やや多	↘	やや多	平年の発生量の推移(↘)
施設野菜	① ミナミキイロアザミウマ	多	→	多	平年の発生量の推移(→)
	② アブラムシ類	やや多	→	やや多	平年の発生量の推移(→)

※発生量は、ほ場調査の結果の平年値または例年値の同月比。

- 平年値：過去5～10年間の発生量の平均値
- 例年値：過去3～4年間の発生量の平均値

※増減傾向は、発生量（現況）と比較した翌月の増減を予測している。



沖縄県病害虫防除技術センターのホームページにて、発生予察の詳細内容やその他情報を掲載しています。

○12月のその他注意すべき病害虫（八重山群島）

作物	病害虫名	発生状況及び防除事項
マンゴー	キクイムシ類	衰弱した枝、幹などから食入し、被害が進むと枯死させる。葉が黄化落葉したり、枝などから線香状の木くず（フラス）が見られたら、侵入部位まで枝を除去し、速やかに施設外に持ち出し処分する。また樹勢が低下することで本虫の加害を受けやすくなるので、樹勢維持に努める。
かぼちゃ	モザイク病	アブラムシが平年に比べ多発生となっており、モザイク病も一部ほ場で発生している。媒介虫の密度が低くても感染力は高いので、葉裏をよく観察し、早期発見・防除に努める。発病株は感染源となるので見つけ次第抜き取り、ほ場外へ持ち出し処分する。本病は汁液伝染するので、ハサミや手の消毒、洗浄を行う。