



作物	さとうきび	地域	宮古群島
病害虫名	バッタ類		
予報	4 月の発生量 (平年比)	少	
	3 月からの増減傾向	↓	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	少	
	その他 (気象要因など)		





調査結果

今年と平年の推移




過去2年間の推移




・発生種：タイワンツチイナゴ

防除のポイント

- ・発生源となるほ場及び周辺のイネ科雑草の除草を徹底する。
- ・幼虫期の防除が効果的なので、4～6月にほ場周辺の見回りを行い幼虫の早期発見、早期防除に努める。


作物	さとうきび	地域	宮古群島
病害虫名	カンシャコバネナガカメムシ(ガイダー)		
予報	4 月の発生量 (平年比)	-	
	3 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)		

調査結果







防除のポイント

- ・ 概ね4～6月に第一世代、7～8月に第二世代、9～10月に第三世代が発生するため、防除適期である4～5月上旬に茎当たり虫数が20頭を越えているほ場では、薬剤による防除を行う。
- ・ 前年の夏植や初回の株出しが被害を受けやすいため、葉鞘の隙間などをよく観察する。
- ・ 収穫後は直ちに畝間耕起し、発生源となる放置株を抜き取り処分する。

作物	さとうきび	地域	宮古群島
病害虫名	① メイチュウ類 (カンシャシクイハマキ)		
予報	4 月の発生量 (平年比)	並	
	3 月からの増減傾向	↗	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)	今後 1 か月の気温が平年より高い見込み	


調査結果




- ・ 芯枯れ発生ほ場率：90% (平年値：88.1%)
- ・ 茎内で発見したメイチュウ類のうち、50.0%(4/8頭) がカンシャシクイハマキであった。
- ・ 防除員報告：多発生 (伊良部島)

防除のポイント

- ・ ふ化した幼虫は、葉裏や葉鞘部から下部に移動した後、地上部の芽や根帯から食入し、生長点を加害して芯枯れを起こさせ茎を枯死させる。
- ・ 加害による芯枯れを防止し有効茎を確保するため、培土時および生育初期の防除を徹底する。
- ・ ほ場内外のイネ科雑草は発生源となるため除去する。
- ・ 乳剤の場合は、葉鞘内に薬液がきちんと浸透するように丁寧に散布する。粉剤の場合は、茎と葉元の間散布し降雨や散水等により溶解させ、葉鞘内部へ浸透させることで防除効果が高まる。
- ・ 植え付け時及び培土時に土壌害虫の防除を兼ねた薬剤(粒剤)を選択し施用する。

作物	さとうきび	地域	宮古群島
病害虫名	② メイチュウ類(イネヨトウ)		
予報	4 月の発生量 (平年比)	並	
	3 月からの増減傾向	↗	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)	今後 1 か月の気温が平年より高い見込み	


調査結果



- ・ 芯枯れ発生ほ場率：90% (平年値：88.1%)
- ・ 茎内で発見したメイチュウ類のうち、50.0%(4/8頭)がイネヨトウであった。
- ・ 防除員報告：多発生 (伊良部島)


防除のポイント

- ・ ふ化した幼虫は、葉裏や葉鞘部から下部に移動した後、地上部の芽や根帯から食入し、生長点を加害して芯枯れを起こさせ茎を枯死させる。
- ・ 加害による芯枯れを防止し有効茎を確保するため、培土時および生育初期の防除を徹底する。
- ・ ほ場内外のイネ科雑草は発生源となるため除去する。
- ・ 乳剤の場合は、葉鞘内に薬液がきちんと浸透するように丁寧に散布する。粉剤の場合は、茎と葉元の間散布し降雨や散水等により溶解させ、葉鞘内部へ浸透させることで防除効果が高まる。
- ・ 植え付け時及び培土時に土壌害虫の防除を兼ねた薬剤(粒剤)を選択し施用する。

作物	さとうきび	地域	宮古群島
病害虫名	サキシマカンシャクシコメツキ		
予報	4 月の発生量 (平年比)	-	
	3 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	-	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今年と平年の推移




防除のポイント

- ・ 発生の多い地域では連作を避ける。
- ・ 植付前に植溝に粒剤を施用する。





カンシャクシコメツキ類(成虫)

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ		
予報	4 月の発生量 (平年比)	-	
	3 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	-	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今期と平年の推移




- ・新梢数が基準に満たなかったため3月の見取り調査のデータなし
- ・トラップ調査の誘殺ほ場率：0.0%（平年値：42.9%）

防除のポイント

- ・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
- ・多発した施設では、収穫後に薬剤による防除を行う。
- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
- ・不要な新梢は、施設外に除去する。




ナガエコミカンソウ

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	マンゴーハフクレタマバエ		
予報	4 月の発生量 (平年比)	-	
	3 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	-	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今期と平年の推移




- ・新梢数が基準に満たなかったため3月の見取り調査のデータなし

防除のポイント


- ・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。
- ・不要な新梢は、ほ場外に除去する。




作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	① ハダニ類		
予報	4 月の発生量 (平年比)	並	
	3 月からの増減傾向	↗	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)	今後 1 か月の気温が平年より高い見込み	

調査結果

今期と平年の推移



過去2年間の推移



- ・ 発生種：シュレイツメハダニ
- ・ 発生ほ場率：40.0% (平年値：36.7%)

防除のポイント


- ・ 薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。




作物	かぼちゃ(1月植え)	地域	宮古群島
病害虫名	① モザイク病		
予報	4 月の発生量 (平年比)	-	
	3 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今年と平年の推移




過去2年間の推移



- ・発生ほ場率：40.0%（平年値：12.1%）
- ・関係機関の情報によると一部ほ場で発生あり



防除のポイント

- ・ほ場周囲に防風対策を兼ねたソルゴーや防虫ネット等を設置し、媒介虫であるアブラムシ類の飛来侵入を防ぐ。
- ・媒介虫の密度が低くても感染力は高いので、葉裏をよく観察し、早期発見・防除に努める。
- ・発病株は感染源となるので見つけ次第抜き取り、ほ場外へ持ち出し処分する。
- ・本病は汁液伝染するので、ハサミや手の消毒、洗浄を行う。



作物	かぼちゃ(1月植え)	地域	宮古群島
病害虫名	② うどんこ病		
予報	4 月の発生量 (平年比)	-	
	3 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今年と平年の推移



過去2年間の推移



・発生ほ場率：80%（平年値：79.4%）


防除のポイント

- ・着果期以降は草勢の低下に伴い被害が急激に広がる場合があるので防除を徹底する。
- ・発生源となる老葉や不要な下葉を除去し、透光通風を良くする。
- ・窒素質肥料の多施用を避け、予防散布を行う。
- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。


作物	かぼちゃ(1月植え)	地域	宮古群島
病害虫名	③ 細菌病		
予報	4 月の発生量 (平年比)	-	
	3 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今年と平年の推移




過去2年間の推移



・発生ほ場率：80.0%（平年値：17.6%）



防除のポイント

- ・強風による葉すれ等の傷口から感染するため、防風垣（ソルゴーや防風ネット等）を設置する。
- ・降雨や強風などの気象条件が続くと急激に広がる場合があるので、風雨前の予防散布を徹底する。



作物	かぼちゃ(1月植え)	地域	宮古群島
病害虫名	④ アブラムシ類		
予報	4 月の発生量 (平年比)	-	
	3 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	(発生なし)並	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今年と平年の推移



過去2年間の推移




・発生ほ場率：0.0%（平年値：32.1%）

防除のポイント

- ・ほ場周辺に防風対策を兼ねた防虫ネットやソルゴー等を設置し、有翅虫の飛来侵入を防ぐ。
- ・葉裏をよく観察し、早期発見・防除に努める。
- ・ほ場周辺の雑草はアブラムシ類の発生源になるので除去する。
- ・本種はウイルス病を媒介する。




有翅虫


作物	とうがん	地域	宮古群島
病害虫名	① うどんこ病		
予報	4 月の発生量 (平年比)	並	
	3 月からの増減傾向	↗	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)	栽培後期にあたり草勢が低下するため	

調査結果

今期と平年の推移




過去2年間の推移



・発生ほ場率：60%（平年値：22.4%）



防除のポイント

- ・発生源となる不用な老葉・下葉を除去し、透光通風をよくする。
- ・除去した葉はほ場内に放置せず、ポリ袋等に入れるなどして持ち出し処分する。
- ・薬剤防除は予防散布に重点をおく。



作物	とうがん	地域	宮古群島
病害虫名	② ミナミキイロアザミウマ		
予報	4 月の発生量 (平年比)	やや多	
	3 月からの増減傾向	↑	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	やや多	
	その他 (気象要因など)	今後 1 か月の気温が平年より高い見込み	

調査結果

今期と平年の推移




過去2年間の推移



・発生ほ場率：80% (平年値：73.5%)


防除のポイント

- ・ほ場周辺の雑草は発生源になるので除草を行う。
- ・多発すると防除が困難になるので、つる先を観察し早期防除に努める。
- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。


作物	とうがん	地域	宮古群島
病害虫名	③ タバココナジラミ		
予報	4 月の発生量 (平年比)	並	
	3 月からの増減傾向	↗	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)	今後 1 か月の気温が平年より高い見込み	

調査結果

今期と平年の推移



過去2年間の推移




・発生ほ場率：20.0%（平年値：36.7%）

防除のポイント


- ・ほ場周辺の雑草は発生源になるので除草を行う。
- ・多発すると防除が困難になるので、葉裏を観察し早期防除に努める。
- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。




作物	とうがん	地域	宮古群島
病害虫名	④ ハダニ類		
予報	4 月の発生量 (平年比)	並	
	3 月からの増減傾向	→	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)	今後 1 か月の気温が平年より高い見込み	

調査結果

今期と平年の推移




過去2年間の推移



・発生ほ場率：20.0% (平年値：12.2%)



防除のポイント

- ・気門封鎖型薬剤の散布を主体とした防除を行う。
- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。



作物	ゴーヤー(施設)	地域	宮古群島
病害虫名	① うどんこ病		
予報	4 月の発生量 (平年比)	並	
	3 月からの増減傾向	↗	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)	栽培後期にあたり草勢が低下するため	

調査結果

今期と平年の推移



過去2年間の推移



・発生ほ場率：80%（平年値：46.9%）


防除のポイント

- ・老葉や病葉は発生源になるので除去し、施設外に持ち出し処分する。
- ・過繁茂を避け、透光通風を良くする。
- ・多湿条件で発生し、その後乾燥が続くと被害が拡大するため、湿度管理に注意する。
- ・多発すると防除が困難になるため、予防散布に重点をおく。硫黄粉剤による予防は効果が期待できる。


作物	ゴーヤー(施設)	地域	宮古群島
病害虫名	② 斑点病		
予報	4 月の発生量 (平年比)	並	
	3 月からの増減傾向	↘	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今期と平年の推移




過去2年間の推移



・発生ほ場率：40.0% (平年値：49.0%)



防除のポイント

- ・葉には周囲が黄色で中央が灰色の円形病斑を形成し、果実では表面にすす状のカビを生じる。
- ・老葉や病葉は発生源になるので、施設外に持ち出し処分する。
- ・過繁茂を避け、透光通風をよくする。
- ・多湿条件で発生が助長されるため、湿度管理に注意する。またビニールの破れは補修する。



作物	ゴーヤー(施設)	地域	宮古群島
病害虫名	③ ミナミキイロアザミウマ		
予報	4 月の発生量 (平年比)	多	
	3 月からの増減傾向	↗	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	多	
	その他 (気象要因など)	今後 1 か月の気温が平年より高い見込み	

調査結果

今期と平年の推移



過去2年間の推移




・発生ほ場率：40.0% (平年値：12.2%)

防除のポイント

- ・本種は吸汁により果実表面にケロイド状の被害を生じるほか、灰白色斑紋病を媒介する。
- ・施設の出入口や側窓は0.6ミリ以下のネット等で被覆し、成虫の侵入を防ぐ。
- ・施設周辺の雑草は本種の発生源になるため除去する。
- ・多発すると防除が困難になるので、つる先や葉裏をよく観察し、早期発見・防除に努める。
- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。




果実の被害


作物	ゴーヤー(施設)	地域	宮古群島
病害虫名	④ タバココナジラミ		
予報	4 月の発生量 (平年比)	並	
	3 月からの増減傾向	↗	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	(発生なし)並	
	その他 (気象要因など)	今後 1 か月の気温が平年より高い見込み	

調査結果

今期と平年の推移



過去2年間の推移



・発生ほ場率：0.0%（平年値：16.3%）


防除のポイント

- ・多くの雑草が発生源となりうるので、施設内外の雑草除去に努める。
- ・施設開口部には目合い0.6ミリ以下の防虫ネットを展張し、本種の侵入を防止する。
- ・黄色粘着テープ等により、早期発見・防除に努める。
- ・幼虫は下位葉の葉裏に多いことに留意しながら薬剤散布を行う。
- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避け、気門封鎖系等の薬剤も利用する。

作物	さやいんげん(施設)	地域	宮古群島
病害虫名	菌核病		
予報	4 月の発生量 (平年比)	-	
	3 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	-	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今期の推移



・発生ほ場率：0.0%（前作：0.0%）


防除のポイント

- ・発病部位は、菌核が形成される前に早めに除去し、ポリ袋に入れるなどしてほ場外へ持ち出し処分する。
- ・多湿条件下で発生しやすいので、老葉病葉は取り除き透光通風をよくする。

作物	さやいんげん(施設)	地域	宮古群島
病害虫名	タバココナジラミ		
予報	4 月の発生量 (平年比)	-	
	3 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	-	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今期の推移



・発生ほ場率：40.0%（前作：20.0%）

防除のポイント


- ・ほ場周辺の雑草は発生源になるので除去する。
- ・本種はさやの白化を引き起こすので、出入り口の防虫ネットを二重にするなどして、施設内への侵入を防止する。
- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。  
また、薬剤抵抗性の発達しにくい気門封鎖剤や微生物農薬を使用する。



作物	さやいんげん(施設)	地域	宮古群島
病害虫名	ミナミキイロアザミウマ		
予報	4 月の発生量 (平年比)	-	
	3 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	-	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今期の推移



・発生ほ場率：60.0%（前作：0.0%）


防除のポイント

- ・ほ場の出入口には二重カーテンなどを設置し、本種の侵入を防ぐ。
- ・ほ場周辺の雑草は本種の発生源となるので、除草を行う。
- ・多発すると防除が困難になるので、発生初期の防除を徹底する。
- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

作物	さやいんげん(施設)	地域	宮古群島
病害虫名	ハモグリバエ類		
予報	4 月の発生量 (平年比)	-	
	3 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	-	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今期の推移



・発生ほ場率：20.0%（前作：20.0%）

防除のポイント


- ・摘葉等による残さは成虫の発生源となるので、ポリ袋に入れるなどして、ほ場外に持ち出し処分する。
- ・本種は薬剤抵抗性が発達し、また野外に多数の在来天敵が存在することから、天敵に影響の少ない選択性殺虫剤を使用する。



作物	さやいんげん(施設)	地域	宮古群島
病害虫名	ハダニ類		
予報	4 月の発生量 (平年比)	-	
	3 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	-	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今期の推移



・発生ほ場率：40.0%（前作：20.0%）


防除のポイント

- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
- ・葉裏に多いことに留意しながら、丁寧に薬剤散布する。

作物	さやいんげん(施設)	地域	宮古群島
病害虫名	ホコリダニ類		
予報	4 月の発生量 (平年比)	-	
	3 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	3 月の発生量 (平年比)	-	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今期の推移



・発生ほ場率：20.0%（前作：20.0%）

防除のポイント

- ・ 20℃での卵から成虫までの発育期間は13～17日と短く、短期間のうちに高密度になりやすいため、早期発見・防除に努める。
- ・ 薬剤が到達しにくい生長点付近や未展開葉に潜っているため、葉散は葉裏へ丁寧に行う。
- ・ ほ場内外に寄主植物(主にナス科雑草)が無いよう除草に努める。