令和　3 年度　　5 月予報

作物	カンショ		地域	沖縄群島
病害虫名	① ナカジロシタバ			
調査結果	4 月の発生量（平年比）	やや多		
予報	4 月からの増減傾向	→		
	5 月の発生量（平年比）	やや多		
予報の根拠		平年の発生量の推移（→）		

調査結果



ナカジロシタバ(幼虫)の発生推移



ナカジロシタバ(被害)の発生推移

防除のポイント

・老齢幼虫になると薬剤の効果が低下するので、若齢期の防除が重要である。

令和　3 年度　　5 月予報

作物	カンショ		地域	沖縄群島
病害虫名	② イモキバガ			
調査結果	4 月の発生量（平年比）	並		
予報	4 月からの増減傾向	↗		
	5 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）		

調査結果



イモキバガ（幼虫）の発生推移



イモキバガ（被害）の発生推移

防除のポイント

・老齢幼虫になると薬剤の効果が低下するので、若齢期の防除が重要である。

令和　3 年度　　5 月予報

作物	カンショ		地域	沖縄群島
病害虫名	トリバ類			
調査結果	4 月の発生量（平年比）	－		
予報	4 月からの増減傾向	—		
	5 月の発生量（平年比）	－		
予報の根拠				

調査結果



トリバ類（幼虫）の発生推移



トリバ類（被害）の発生推移

防除のポイント

発生初期の防除が有効であるので、被害葉が出はじめたら、薬剤散布する。