令和　8 年度　　4 月予報

作物	ニガウリ(施設)		地域	宮古群島
病害虫名	① うどんこ病			
調査結果	3 月の発生量（平年比）	並		
予　報	3 月からの増減傾向	↘		
	4 月の発生量（平年比）	やや多		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↘）		

調査結果

発病葉率の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生施設率100%（平年：48.0%）

防除のポイント

・多湿条件で発生し、その後乾燥が続くと被害が拡大するため、湿度管理に注意する。

・過繁茂を避け、透光通風を良くする。

・老葉や病葉は伝染源になるので除去し、施設外に持ち出し処分する。

・多発すると防除が困難になるため、予防散布に重点をおく。硫黄粉剤による予防は効果が期待できる。

令和　8 年度　　4 月予報

作物	ニガウリ(施設)		地域	宮古群島
病害虫名	② 斑点病			
調査結果	3 月の発生量（平年比）	並		
予報	3 月からの増減傾向	→		
	4 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（→）		

調査結果

発病葉率の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生施設率40.0%（平年：52.0%）

防除のポイント

・葉には周囲が黄色で中央が灰色の円形病斑を形成し、果実では表面にすす状のカビを生じる。
・多湿条件で発生が助長されるため、湿度管理に注意する。
・過繁茂を避け、透光通風をよくする。
・老葉や病葉は伝染源になるので、施設外に持ち出し処分する。
・雨漏りする場所での発生が多くなるため、ビニールの破れ等は補修する。

令和　8 年度　　4 月予報

作物	ニガウリ(施設)		地域	宮古群島
病害虫名	③ タバココナジラミ		成虫	
調査結果	3 月の発生量（平年比）	並		
予報	3 月からの増減傾向	↗		
	4 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）		

調査結果

成虫数の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生施設率20.0%（平年：26.0%）

防除のポイント

・多くの雑草が発生源となりうるので、施設内外の雑草除去に努める。
・施設の出入口や天窓は目合いの細かいネット等で被覆し、成虫の侵入を防ぐ。
・黄色粘着テープ等により、早期発見・防除に努める。
・幼虫は下位葉の葉裏に多いことに留意しながら薬剤散布を行う。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避け、気門封鎖系等の薬剤も利用する。

幼虫