




作物	ゴーヤー(施設)	地域	沖縄群島
病害虫名	① モザイク病(スイカ灰白色斑紋ウイルス以外)		
5月の発生量(現況)	(発生なし)並		
6月の増減傾向	↗		
増減傾向の根拠	媒介虫であるアブラムシ類の発生量が増加する見込みであることから、5月より発生量は増加すると考えられる。		

発生量の根拠(調査結果)




防除のポイント

- ・ 灰白色斑紋病以外のウイルス病は主にアブラムシ類によって媒介される。
- ・ 発病株は伝染源となるため見つけ次第抜き取り、施設外に持ち出しビニール袋に入れて密閉処分する。
- ・ 本病は汁液伝染するので、ハサミや手の消毒・洗浄を行う。



作物	ゴーヤー(施設)	地域	沖縄群島
病害虫名	② うどんこ病		
5月の発生量(現況)	(発生なし)やや少		
6月の増減傾向	↗		
増減傾向の根拠	今後1か月の降水量が平年より少ない見通しから、5月より発生量は増加すると考えられる。		

発生量の根拠(調査結果)





防除のポイント

- ・老葉や病葉は発生源になるので除去し、施設外に持ち出し処分する。
- ・過繁茂を避け、透光通風を良くする。
- ・多湿条件で発生し、その後乾燥が続くと被害が拡大するため、湿度管理に注意する。
- ・多発すると防除が困難になるため、予防散布に重点をおく。硫黄粉剤による予防は効果が期待できる。


作物	ゴーヤー(施設)	地域	沖縄群島
病害虫名	③ ミナミキイロアザミウマ		 
5月の発生量(現況)	並		
6月の増減傾向	↗		
増減傾向の根拠	今後1か月の気温が平年より高い見通しから、5月より発生量は増加すると考えられる。		

発生量の根拠(調査結果)




防除のポイント

- ・ 本種は吸汁により果実表面にケロイド状の被害を生じるほか、灰白色斑紋病を媒介する。
- ・ 施設の出入口や側窓は0.9ミリ以下のネット等で被覆し、成虫の侵入を防ぐ。
- ・ 施設周辺の雑草は本種の発生源になるため除去する。
- ・ 多発すると防除が困難になるので、つる先や葉裏をよく観察し、早期発見・防除に努める。
- ・ 薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

作物	ゴーヤー(施設)	地域	沖縄群島
病害虫名	④ アブラムシ類		
5月の発生量(現況)	やや多		
6月の増減傾向	↗		
増減傾向の根拠	今後1か月の気温が平年より高い見通しから、5月より発生量は増加すると考えられる。		

発生量の根拠(調査結果)



防除のポイント

- ・本種はウイルス病を媒介する。
- ・施設の出入口や側窓は0.6ミリ以下のネット等で被覆し、有翅虫の侵入を防ぐ。
- ・施設周辺の雑草は本種の発生源になるため除去する。
- ・発生初期は局所的に分布するので、被害葉を除去し、スポット散布を行う。