






作物	ゴーヤー(施設)	地域	宮古群島
病害虫名	① うどんこ病		
予報	6 月の発生量 (平年比)	-	
	5 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	5 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今期と平年の推移



過去2年間の推移




防除のポイント

- ・老葉や病葉は発生源になるので除去し、施設外に持ち出し処分する。
- ・過繁茂を避け、透光通風を良くする。
- ・多湿条件で発生し、その後乾燥が続くと被害が拡大するため、湿度管理に注意する。
- ・多発すると防除が困難になるため、予防散布に重点をおく。硫黄粉剤による予防は効果が期待できる。


作物	ゴーヤー(施設)	地域	宮古群島	
病害虫名	② 斑点病			
予報	6 月の発生量 (平年比)			-
	5 月からの増減傾向			-
予報の根拠	5 月の発生量 (平年比)	並		
	その他 (気象要因など)			

調査結果

今期と平年の推移



過去2年間の推移



- ・一部の定点調査ほ場で多発生していた。

防除のポイント

- ・葉には周囲が黄色で中央が灰色の円形病斑を形成し、果実では表面にすす状のカビを生じる。
- ・老葉や病葉は発生源になるので、施設外に持ち出し処分する。
- ・過繁茂を避け、透光通風をよくする。
- ・多湿条件で発生が助長されるため、湿度管理に注意する。またビニールの破れは補修する。