



作物	さとうきび	地域	八重山群島
病害虫名	① バッタ類		
予報	9 月の発生量（平年比） 8 月からの増減傾向	- -	
予報の根拠	8 月の発生量（平年比） その他 (気象要因など)	並	

調査結果

今年と平年の推移



過去2年間の推移



・発生種：タイワンツチイナゴ、チュウゴクヒゲナガイナゴ


防除のポイント

- ・発生源となるほ場及び周辺の除草を徹底する。
- ・成虫防除を実施する場合には、活動の鈍い早朝に一斉防除を行うと効果的である。


作物	さとうきび	地域	八重山群島
病害虫名	② メイチュウ類 (カンシャシンクイハマキ)		
予報	9 月の発生量 (平年比) 並 8 月からの増減傾向 →		
予報の根拠	8 月の発生量 (平年比) 並 その他 (気象要因など)	トラップ誘殺虫数の平年の推移	

調査結果

今年と平年の推移



過去2年間の推移




防除のポイント

- ふ化した幼虫は、葉裏や葉鞘部から下部に移動した後、地上部の芽や根帯から食入し、生長点を加害して芯枯れを起こさせ茎を枯死させる。
- 加害による芯枯れを防止し有効茎を確保するため、培土時および生育初期の防除を徹底する。
- ほ場内外のイネ科雑草は発生源となるため除去する。
- 乳剤の場合は、葉鞘内に薬液がきちんと浸透するように丁寧に散布する。粉剤の場合は、茎と葉元の間に散布し降雨や散水等により溶解させ、葉鞘内部へ浸透させることで防除効果が高まる。
- 植え付け時及び培土時に土壤害虫の防除を兼ねた薬剤(粒剤)を選択し施用する。


作物	さとうきび	地域	八重山群島
病害虫名	メイチュウ類(イネヨトウ)		
予報	9 月の発生量 (平年比) 少 8 月からの増減傾向 ↓		
予報の根拠	8 月の発生量 (平年比) 少 その他 (気象要因など)	トラップ誘殺虫数の平年の推移	

調査結果

今年と平年の推移



過去2年間の推移



防除のポイント

- ・ふ化した幼虫は、葉裏や葉鞘部から下部に移動した後、地上部の芽や根帯から食入り、生長点を加害して芯枯れを起こさせ茎を枯死させる。
- ・加害による芯枯れを防止し有効茎を確保するため、培土時および生育初期の防除を徹底する。
- ・ほ場内外のイネ科雑草は発生源となるため除去する。
- ・乳剤の場合は、葉鞘内に薬液がきちんと浸透するように丁寧に散布する。粉剤の場合は、茎と葉元の間に散布し降雨や散水等により溶解させ、葉鞘内部へ浸透させることで防除効果が高まる。
- ・植え付け時及び培土時に土壤害虫の防除を兼ねた薬剤(粒剤)を選択し施用する。