




作物	かんきつ (タンカン)		地域	沖縄群島	
病害虫名	① 黒点病				
調査結果	9 月の発生量 (平年比)	やや多			
予報	9 月からの増減傾向	→			
	10 月の発生量 (平年比)	やや多			
予報の根拠		平年の発生量の推移 (→)			

調査結果


発病葉率の推移



- ・ 果実の発病度1.6 (平年3.2)
- ・ 発生ほ場率100% (平年 : 44.4%)

防除のポイント


- ・ 周辺の防風樹も含め、枯れ枝は除去する。
- ・ ほ場内の通風、採光を良くするために、間伐、せん定等の管理を徹底する。

作物	かんきつ (タンカン)	地域	沖縄群島
病害虫名	② ハダニ類		
調査結果	9 月の発生量 (平年比)	並	
予報	9 月からの増減傾向	→	
	10 月の発生量 (平年比)	並	
予報の根拠	平年の発生量の推移 (→)		


調査結果

寄生葉率の推移

<今期と平年>



<過去2年>



- ・発生種：ミカンハダニ
- ・発生ほ場率40.0% (平年：27.3%)

防除のポイント

- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。



ハダニの寄生による葉のかすれ症状