




作物	かんきつ（タンカン）		地域	沖縄群島
病害虫名	① 黒点病			
調査結果	10 月の発生量（平年比）	やや多		
予報	10 月からの増減傾向	↗		
	11 月の発生量（平年比）	やや多		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）		

調査結果


発病果率の推移



- ・ 果実の発病度2.3（平年3.2）
- ・ 発生ほ場率100%（平年：38.6%）



防除のポイント

- ・ 周辺の防風樹も含め、枯れ枝は除去する。
- ・ ほ場内の通風、採光を良くするために、間伐、せん定等の管理を徹底する。

作物	かんきつ（タンカン）		地域	沖縄群島
病害虫名	② ハダニ類			 <p>ミカンハダニ</p>
調査結果	10 月の発生量（平年比）	並		
予報	10 月からの増減傾向	→		
	11 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（→）		

調査結果

寄生葉率の推移



- ・発生種：ミカンハダニ
- ・発生ほ場率20.0%（平年：36.4%）

防除のポイント

- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。



ハダニの寄生による葉のかすれ症状