令和　3 年度　10 月予報

作物	ヘチマ		地域	沖縄群島
病害虫名	べと病			
調査結果	9 月の発生量（平年比）	(発生なし)並		
予報	9 月からの増減傾向	－		
	10 月の発生量（平年比）	－		
予報の根拠				

調査結果

（平　均）



（中央値）



・発病ほ場率　0.0%（平年4.0%）

防除のポイント

・気温が10～25℃で多湿条件下で発生しやすい。
・老化した葉を除去し、採光・通風を良くする。
・適正な施肥管理を行う。

被害葉→

令和　3 年度　10 月予報

作物	ヘチマ		地域	沖縄群島
病害虫名	うどんこ病			
調査結果	9 月の発生量（平年比）	(発生なし)並		
予報	9 月からの増減傾向	―		
	10 月の発生量（平年比）	―		
予報の根拠				

調査結果

（平　均）



（中央値）



・発病ほ場率　0.0%（平年 0.0%）

防除のポイント

・気温が10～25℃で多湿条件下で発生しやすい。

・老化した葉を除去し、採光・通風を良くする。

・適正な施肥管理を行う。

令和　3 年度　10 月予報

作物	ヘチマ		地域	沖縄群島
病害虫名	ハモグリバエ類			
調査結果	9 月の発生量（平年比）	(発生なし)並		
予報	9 月からの増減傾向	―		
	10 月の発生量（平年比）	―		
予報の根拠				

調査結果

（平　均）



（中央値）



・発病ほ場率　0.0%（平年 6.0%）

防除のポイント

・気温が10～25℃で多湿条件下で発生しやすい。

・老化した葉を除去し、採光・通風を良くする。

・適正な施肥管理を行う。

令和　3 年度　10 月予報

作物	ヘチマ		地域	沖縄群島
病害虫名	ヒメクロウリハムシ			
調査結果	9 月の発生量（平年比）	並		
予報	9 月からの増減傾向	ー		
	10 月の発生量（平年比）	ー		
予報の根拠				

調査結果

（平　均）



（中央値）



・発病ほ場率 100.0%（平年 78.0%）

防除のポイント

・気温が10～25℃で多湿条件下で発生しやすい。

・老化した葉を除去し、採光・通風を良くする。

・適正な施肥管理を行う。

令和　3 年度　10 月予報

作物	ヘチマ		地域	沖縄群島
病害虫名	ミナミキイロアザミウマ			
調査結果	9 月の発生量（平年比）	多		
予報	9 月からの増減傾向	―		
	10 月の発生量（平年比）	―		
予報の根拠				

調査結果



（平　均）



（中央値）

・発病ほ場率 20.0%（平年 10.0%）



（平　均）



（中央値）

・発病ほ場率80.0%（平年 4.0%）

防除のポイント

・気温が10～25℃で多湿条件下で発生しやすい。

・老化した葉を除去し、採光・通風を良くする。

・適正な施肥管理を行う。