令和　4 年度　　7 月予報

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ		
調査結果	6 月の発生量（平年比）	並	
予報	6 月からの増減傾向	ー	
	7 月の発生量（平年比）	ー	
予報の根拠			

調査結果

トラップ調査　　（今期と平年の推移）



（過去2年間の推移）



・発生施設率：50.0%（平年値：76.3%）

防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・収穫期に発生の多かった施設では、せん定終了後に薬剤による防除を行う。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

令和　4 年度　　7 月予報

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	① ハダニ類	シュレイツメハダニ	
調査結果	6 月の発生量（平年比）	多	
予報	6 月からの増減傾向	↗	
	7 月の発生量（平年比）	やや多	
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗） 一部ほ場で発生が見られた。	

調査結果

（今期と平年の推移）



（過去2年間の推移）



（発生施設率の推移）



発生種：シュレイツメハダニ、マンゴーツメハダニ

防除のポイント

・収穫終了後の防除を徹底する。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症状

マンゴーツメハダニ