令和　4 年度　　7 月予報

作物	マンゴー	地域	八重山群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ		
調査結果	6 月の発生量（平年比）	並	
予報	6 月からの増減傾向	↗	
	7 月の発生量（平年比）	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）	

調査結果

今期と平年の推移





過去２年間の推移





・発生施設率：20.0%（平年値：43.2%）

防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・収穫期に発生の多かった施設では、せん定終了後に薬剤による防除を行う。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

令和　4 年度　　7 月予報

作物	マンゴー	地域	八重山群島
病害虫名	② マンゴーハフクレタマバエ		
調査結果	6 月の発生量（平年比）	並	
予報	6 月からの増減傾向	↘	
	7 月の発生量（平年比）	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移（↘）	

調査結果

今期と平年の推移



過去２年間の推移



・発生施設率：80.0%（平年値：65.2%）

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。

被害のようす

令和　4 年度　　7 月予報

作物	マンゴー		地域	八重山群島
病害虫名	③ ハダニ類		シュレイツメハダニ	
調査結果	6 月の発生量（平年比）	やや多		
予報	6 月からの増減傾向	↗		
	7 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）		

調査結果

今期と平年の推移



過去２年間の推移



・ 発生施設率：40.0%（平年値：40.0%）

防除のポイント

・収穫終了後の防除を徹底する。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症