令和　4 年度　　8 月予報

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ		
調査結果	7 月の発生量（平年比）	並	
予報	7 月からの増減傾向	↗	
	8 月の発生量（平年比）	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）	

調査結果

見取り調査：今期と平年の推移



見取り調査：過去２年の推移



トラップ調査：今期と平年の推移



トラップ調査：過去２年の推移



・発生施設率40.0%（平年：75.0%）

防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・収穫期に発生の多かった施設では、せん定終了後に薬剤による防除を行う。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

令和　4 年度　　8 月予報

作物	マンゴー		地域	宮古群島
病害虫名	② ハダニ類		シュレイツメハダニ	
調査結果	7 月の発生量（平年比）	やや多		
予報	7 月からの増減傾向	↘		
	8 月の発生量（平年比）	やや多		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↘）		

調査結果

今期と平年の推移



過去２年の推移



・発生施設率80.0（平年：49.0%）

防除のポイント

・収穫終了後の防除を徹底する。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症状

マンゴーツメハダニ