令和　5 年度　　8 月予報

作物	マンゴー		地域	八重山群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ			
調査結果	7 月の発生量（平年比）	並		
予　報	7 月からの増減傾向	↘		
	8 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↘）		

調査結果

葉当たり成幼虫数の推移（今期と平年）



葉当たり成幼虫数の推移（過去２年）



トラップ当たり誘殺虫数の推移（今期と平年）



トラップ当たり誘殺虫数の推移（過去２年）



・発生施設率20.0%（平年：54.2%）

防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・収穫期に発生の多かった施設では、せん定終了後に薬剤による防除を行う。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

令和　5 年度　　8 月予報

作物	マンゴー		地域	八重山群島
病害虫名	② マンゴーハフクレタマバエ			
調査結果	7 月の発生量（平年比）	並		
予報	7 月からの増減傾向	↗		
	8 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）		

調査結果

被害新梢率の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生施設率40.0%（平年：50.0%）

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。

被害葉

令和　5 年度　　8 月予報

作物	マンゴー		地域	八重山群島
病害虫名	③ ハダニ類		シュレイツメハダニ	
調査結果	7 月の発生量（平年比）	並		
予報	7 月からの増減傾向	↘		
	8 月の発生量（平年比）	多		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↘）		

調査結果

雌成虫数の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生施設率60.0%（平年：36.7%）

防除のポイント

・収穫終了後の防除を徹底する。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による果実のまだら症状

ハダニの寄生による葉のかすれ症状

マンゴーツメハダニ