令和　6 年度　11 月予報

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ		
調査結果	10 月の発生量（平年比）	並	
予　報	10 月からの増減傾向	↘	
	11 月の発生量（平年比）	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移（↘）	

調査結果

葉当たり成幼虫数の推移（今期と平年）



葉当たり成幼虫数の推移（過去２年）



トラップ当たり誘殺虫数の推移（今期と平年）



トラップ当たり誘殺虫数の推移（過去２年）



・発生施設率60.0%（平年：68.8%）

防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

令和　6 年度　11 月予報

作物	マンゴー		地域	宮古群島
病害虫名	② マンゴーハフクレタマバエ			
調査結果	10 月の発生量（平年比）	並		
予報	10 月からの増減傾向	↘		
	11 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↘）		

調査結果

寄生新梢率の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生施設率100%（平年：68.8%）

防除のポイント

・繁殖スピードが極めて速いと考えられることから、被害が発生した新梢部は直ちに剪定し、虫が分散するのを防ぐためビニール袋にいれて処分する。

・幼虫は成熟すると新梢を脱出し、飛び跳ねて地面に落下し蛹化する。この時頭や服に付着して移動するのを防止するため、なるべくポケットなどの引っ掛かりの少ない服装を着用し、出入りの際によく払う。
また、靴にも幼虫や蛹が付着している恐れがあるため、出入り口では靴の土も落とすようにする。

被害葉

令和　6 年度　11 月予報

作物	マンゴー		地域	宮古群島
病害虫名	③ ハダニ類		シュレイツメハダニ	
調査結果	10 月の発生量（平年比）	やや多		
予報	10 月からの増減傾向	→		
	11 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（→）		

調査結果

雌成虫数の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生種：シュレイツメハダニ、マンゴーツメハダニ

・発生施設率80.0%（平年：30.6%）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症状

マンゴーツメハダニ