令和　6 年度　12 月予報

| 作物 | マンゴー | | 地域 | 宮古群島 |
|---|---|---|---|---|
| 病害虫名 | チャノキイロアザミウマ | | | |
| 調査結果 | 11 月の発生量（平年比） | 並 | | |
| 予　報 | 11 月からの増減傾向 | ↘ | | |
| | 12 月の発生量（平年比） | 並 | | |
| 予報の根拠 | | 平年の発生量の推移（↘） | | |

調査結果

トラップ当たり誘殺虫数の推移

＜今期と平年＞




＜過去２年＞




・発生施設率80.0%（平年：76.3%）

防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。

・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

令和　6 年度　12 月予報

| 作物 | マンゴー | | 地域 | 宮古群島 |
|---|---|---|---|---|
| 病害虫名 | ① ハダニ類 | | シュレイツメハダニ | |
| 調査結果 | 11 月の発生量（平年比） | 並 | | |
| 予報 | 11 月からの増減傾向 | → | | |
| | 12 月の発生量（平年比） | 並 | | |
| 予報の根拠 | | 平年の発生量の推移（→） | | |

調査結果

雌成虫数の推移

＜今期と平年＞




＜過去２年＞




・発生種：シュレイツメハダニ、マンゴーツメハダニ

・発生施設率80.0%（平年：30.0%）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

・冬季はマシン油乳剤による防除が効果的である。本薬剤は天敵に影響が少がらの防除が期待できる。

ハダニの寄生による葉のかすれ症状

マンゴーツメハダニ