令和　6 年度　　1 月予報

作物	マンゴー		地域	宮古群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ			
調査結果	12 月の発生量（平年比）	並		
予　報	12 月からの増減傾向	→		
	1 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（→）		

調査結果

トラップ当たり誘殺虫数の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生施設率20.0%（平年：33.3%）

防除のポイント

・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。

・出蕾・開花期における本種の増加を抑制するため、ビニール被覆前後に予防散布を行う。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

・不要な新梢は、施設外に除去する。

ナガエコミカンソウ

令和　6 年度　　1 月予報

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	① ハダニ類	シュレイツメハダニ	
調査結果	12 月の発生量（平年比）	並	
予報	12 月からの増減傾向	→	
	1 月の発生量（平年比）	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移（→）	

調査結果

雌成虫数の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生施設率60.0%（平年：32.3%）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

・冬季はマシン油乳剤による防除が効果的である。本薬剤は天敵に影響が少がらの防除が期待できる。

ハダニの寄生による葉のかすれ症状

マンゴーツメハダニ