令和　8 年度　　4 月予報

作物	マンゴー		地域	沖縄群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ			
調査結果	3 月の発生量（平年比）	並		
予　報	3 月からの増減傾向	→		
	4 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（→）		

調査結果

トラップ当たり誘殺虫数の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生施設率75.0%（平年：42.5%）

防除のポイント

・開花期以降は本種が増加しやすいので、早期発見・防除に努める。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・不要な新梢は、施設外に除去する。
・開花中に薬剤散布を行う場合は、受粉昆虫に影響のない薬剤を選択する。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

令和　8 年度　　4 月予報

作物	マンゴー		地域	沖縄群島
病害虫名	① ハダニ類		シュレイツメハダニ	
調査結果	3 月の発生量（平年比）	やや多		
予報	3 月からの増減傾向	↗		
	4 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）		

調査結果

雌成虫数の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生種：シュレイツメハダニ
・発生施設率16.7%（平年：24.7%）
・一部ほ場で多発

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症状

マンゴーツメハダニ