令和　8 年度　　6 月予報

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ		
調査結果	5 月の発生量（平年比）	並	
予　報	5 月からの増減傾向	↗	
	6 月の発生量（平年比）	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）	

調査結果

トラップ当たり誘殺虫数の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生施設率75.0%（平年：65.0%）、一部ほ場で多発（防除員報告より）。

防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

令和　8 年度　　6 月予報

作物	マンゴー		地域	沖縄群島
病害虫名	① ハダニ類		シュレイツメハダニ	
調査結果	5 月の発生量（平年比）	並		
予報	5 月からの増減傾向	→		
	6 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（→）		

調査結果

雌成虫数の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生種：シュレイツメハダニ

・発生施設率25.0%（平年：53.1%）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症状

マンゴーツメハダニ