平成　30 年度

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ		
3 月の発生量（現況）	並		
4 月の増減傾向	→		
増減傾向の根拠	トラップ誘殺虫数の平年の発生推移から、3月と同程度の発生量と考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）



チャノキイロアザミウマ(トラップ)の発生推移



アザミウマ類の発生推移

防除のポイント

・開花期以降は本種が増加しやすいので、早期発見・早期防除に努める。
・開花中に薬剤散布を行う場合は、受粉昆虫に影響のない薬剤を選択する。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
・キダチコミカンソウなど、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・不要な新梢は、施設外に除去する。

平成　30 年度

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	② ハダニ類		
3 月の発生量（現況）	ややや多		
4 月の増減傾向	↗		
増減傾向の根拠	雌成虫数の平年の発生推移から、3月より発生量は増加すると考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）



ハダニ類の発生推移

・発生種はすべてマンゴーツメハダニであった。

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。