平成　30 年度

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ		
6 月の発生量（現況）	多		
7 月の増減傾向	↗		
増減傾向の根拠	虫数の平年の発生推移から、6月より発生量は増加すると考えらる。		

発生量の根拠（調査結果）



チャノキイロアザミウマ(トラップ)の発生推移

防除のポイント

・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・多発した施設では、収穫後に薬剤による防除を行う。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
・不要な新梢は、施設外に除去する。

平成　30 年度

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	② マンゴーハフクレタマバエ		
6 月の発生量（現況）	多		
7 月の増減傾向	↘		
増減傾向の根拠	発生株率の平年の発生推移から、6月より発生量は減少すると考えらる。		

発生量の根拠（調査結果）

今年と平年の推移



マンゴーハフクレタマバエの発生推移

過去２年間の推移



マンゴーハフクレタマバエの発生推移

・一部ほ場では、多発していた。

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。

・翌年の着果枝となる新梢が加害されると減収につながるため、多発施設ではせん定終了後に薬剤による防除を行う。せん定枝は施設外に処分する。

平成　30 年度

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	③ ハダニ類		
6 月の発生量（現況）	並		
7 月の増減傾向	↗		
増減傾向の根拠	雌成虫数の平年の発生推移から、6月より発生量は増加すると考えらる。		

発生量の根拠（調査結果）

今年と平年の推移



過去２年間の推移



防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。