平成　29 年度

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ		
12 月の発生量（現況）	やや多		
1 月の増減傾向	↘		
増減傾向の根拠	成虫・幼虫及びトラップ誘殺虫数の平年の発生推移から、12月より発生量は減少すると考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）

- 12月中旬の調査の結果、葉当たり成虫・幼虫数（中央値）は2.2頭（前年0.6頭、平年0.1頭）と平年よりやや多かった。
- 黄色粘着トラップへの日・トラップ当たり誘殺虫数は0.3頭（前年0.5頭、平年0.5頭）と平年並であった。

（今年のデータ）



アザミウマ類の発生推移　（中央値）



チャノキイロアザミウマ(トラップ)の発生推移



アザミウマ類の発生推移　（平均値）

（過去２年のデータ）



チャノキイロアザミウマ(トラップ)の発生推移

防除のポイント

- 不要な新梢は、ほ場外に除去する。
- 発生源となる施設内外の雑草を除去する。
- 薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
- 平成29年度病害虫発生予報第５号（平成29年７月27日付）コラム参照。

平成　29 年度

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	② マンゴーハフクレタマバエ		
12 月の発生量（現況）	並		
1 月の増減傾向	↘		
増減傾向の根拠	発生株率の平年の発生推移、新梢の発生がほぼ終息していることから、12月より発生量は減少すると考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）

・ 12月中旬の調査の結果、発生株率は30.0%（前年85.7%、平年13.7%）と平年並であった。

（今年のデータ）



（過去２年のデータ）



防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。

・不要な新梢は、ほ場外に除去する。

・平成29年度病害虫発生予報第５号（平成29年７月27日付）コラム参照。

平成　29 年度

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	③ ハダニ類		
12 月の発生量（現況）	並		
1 月の増減傾向	↘		
増減傾向の根拠	雌成虫数の平年の発生推移から、12月より発生量は減少すると考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）

・ 12月中旬の調査の結果、葉当たり雌成虫数は0.4頭（前年0.1頭、平年0.3頭）と平年並であった。また、新葉の葉当たり雌成虫数は0.1頭であった。

・ ハダニの発生が確認された６施設のうち、シュレイツメハダニは６施設、マンゴーツメハダニは１施設で発生が確認された。

（今年のデータ）



ハダニ類の発生推移

（過去２年のデータ）



ハダニ類の発生推移

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

・平成29年度病害虫発生予報第５号（平成29年７月27日付）コラム参照。

ハダニの寄生による葉のかすれ症状