

作物	マンゴー		地域	沖縄群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ		*	
1月の発生量(現況)		並		
2 月の増減傾向		\rightarrow		
増減傾向の根拠		トラップの誘殺虫数の平年の発生推移から、1月と同程度の発生量と考えられる。		


発生量の根拠 (調査結果)

・1月の黄色粘着トラップへの日・トラップ当たり誘殺虫数は0.1頭(前年0.1頭未満、平年0.2頭)と平年並であった。





(過去2年のデータ)



防除のポイント


- ・キダチコミカンソウなど、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
- ・不要な新梢は、施設外に除去する。
- ・平成29年度病害虫発生予報第5号(平成29年7月27日付)コラム参照。

作物	マンゴー		地域	沖縄群島
病害虫名	② ハダ二類		1	\ / \
1月の発生量(現況)		並		
2 月の増減傾向		7		
増減傾向の根拠		雌成虫数の平年の発生推移から、1月より発生量は増加すると考えられる。		


発生量の根拠 (調査結果)

・1月中旬の調査の結果、葉当たり雌成虫数は0.3頭(前年0.4頭、平年0.1頭)と平年並であった。発生種はすべてシュレイツメハダニであった。

(今年のデータ)



(過去2年のデータ)



防除のポイント

- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
- ・平成29年度病害虫発生予報第5号(平成29年7月27日付)コラム参照。



ハダニの寄生による葉のかすれ症状