平成　30 年度

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ		
12 月の発生量（現況）	並		
1 月の増減傾向	↘		
増減傾向の根拠	成虫・幼虫数の平年の発生推移から、12月より発生量は減少すると考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）

（見取り調査）



アザミウマ類の発生推移

・ 一部施設で多発した

（トラップ調査）



ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ(ﾄﾗｯﾌﾟ)の発生推移

防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。

・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

平成　30 年度

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	② マンゴーハフクレタマバエ		
12 月の発生量（現況）	ややや多		
1 月の増減傾向	↘		
増減傾向の根拠	発生株率の平年の発生推移から、12月より発生量は減少すると考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）



マンゴーハフクレタマバエの発生推移

・ 発生ほ場率：100%

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。

平成　30 年度

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	③ ハダニ類		
12 月の発生量（現況）	多		
1 月の増減傾向	↘		
増減傾向の根拠	雌成虫数の平年の発生推移から、12月より発生量は減少すると考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）

（成葉における調査結果）



ハダニ類の発生推移

- 一部施設で多発した。
- 発生施設率：３7.5%（3/8）
- 新梢では発生は確認できなかった。
- シュレイツメハダニのみ発生：２施設　　マンゴーツメハダニのみ発生：１施設
- ハダニ多発施設における発生種はマンゴーツメハダニであった。

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症状