平成　30 年度

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ		
1 月の発生量（現況）	並		
2 月の増減傾向	→		
増減傾向の根拠	成虫・幼虫数の平年の発生推移から、１月と同程度の発生量だと考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）

（見取り調査）



アザミウマ類の発生推移

（トラップ調査）



チャノキイロアザミウマ(トラップ)の発生推移

・ 防除員報告：中発生（本島北部）

防除のポイント

・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。

・出蕾・開花期における本種の増加を抑制するため、ビニール被覆前後に予防散布を行う。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

・不要な新梢は、施設外に除去する。

ナガエコミカンソウ

平成　30 年度

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	② マンゴーハフクレタマバエ		
1 月の発生量（現況）	並		
2 月の増減傾向	→		
増減傾向の根拠	発生株率の平年の発生推移から、１月と同程度の発生量だと考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）



マンゴーハフクレタマバエの発生推移

・ 一部施設で多発生であった（発生株率16.7、33.3%）。
・ 発生施設率：33.3%（２／６）

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。
・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。

平成　30 年度

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	③ ハダニ類		
1 月の発生量（現況）	並		
2 月の増減傾向	→		
増減傾向の根拠	雌成虫数の平年の発生推移から、１月と同程度の発生量だと考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）

（成葉における調査結果）



ハダニ類の発生推移

- 一部施設で多発した（寄生葉率：0.2%、0.9%、8.2%）。
- 発生施設率：３7.5%（3/8）
- 多発生施設では、花蕾への寄生も確認された。
- 発生種はシュレイツメハダニであった。

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症状