平成　30 年度

作物	マンゴー	地域	八重山群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ		
1 月の発生量（現況）	並		
2 月の増減傾向	→		
増減傾向の根拠	成虫・幼虫数及び誘殺虫数の平年の発生推移から、１月と同程度の発生量と考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）



チャノキイロアザミウマの発生推移



ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ（ﾄﾗｯﾌﾟ）の発生推移

- 調査地域：石垣市
- 新葉あたり成虫・幼虫数（頭/葉）：0（前年0、平年0、判定「並」）
- 黄色粘着トラップ誘殺虫数（頭/日）：0.1未満（前年0.1、平年0.1、判定「並」）

防除のポイント

・開花期以降は本種が増加しやすいので、早期発見・防除に努める。
・開花中に薬剤散布を行う場合は、受粉昆虫に影響のない薬剤を選択する。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・不要な新梢は、施設外に除去する。

平成　30 年度

作物	マンゴー	地域	八重山群島
病害虫名	② ハダニ類		
1 月の発生量（現況）	並		
2 月の増減傾向	↘		
増減傾向の根拠	雌成虫数の平年の発生推移から、１月より発生量は減少すると考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）



ハダニ類の発生推移



ハダニ類の発生推移

・　調査地域：石垣市
・　成葉あたり雌成虫数（頭/葉）：0.1未満（前年0、平年0.4、判定「並」）
　　発生種：シュレイツメハダニ
・　新葉あたり雌成虫数（頭/葉）：0（前年ー）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。