平成　31 年度　　10 月予報

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ		
予報	10 月の発生量（平年比）	並	
	9 月からの増減傾向	↗	
予報の根拠	9 月の発生量（平年比）	並	
	その他 (気象要因など)	平年の発生量の推移（↗）	

調査結果

（見取り調査）

〈中央値〉



〈算術平均値〉



（トラップ調査）

〈中央値〉



〈算術平均値〉



防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

平成　31 年度　　10 月予報

作物	マンゴー		地域	沖縄群島
病害虫名	② マンゴーハフクレタマバエ			
予報	10 月の発生量（平年比）	やや多		
	9 月からの増減傾向	↗		
予報の根拠	9 月の発生量（平年比）	やや多		
	その他 (気象要因など)	平年の発生量の推移（↗）		

調査結果



マンゴーハフクレタマバエの発生推移

- 被害新梢率：27.4%
- 発生施設率：100%（平年53.1%）

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。

平成　31 年度　　10 月予報

作物	マンゴー		地域	沖縄群島
病害虫名	③ ハダニ類		シュレイツメハダニ	
予報	10 月の発生量（平年比）	並		
	9 月からの増減傾向	↗		
予報の根拠	9 月の発生量（平年比）	並		
	その他 (気象要因など)	平年の発生量の推移（↗）		

調査結果



ハダニ類の発生推移

- 発生種：シュレイツメハダニ、マンゴーツメハダニ
- 発生施設率：62.5%（平年62.7%）
- 新梢での寄生雌成虫数：0.1頭以下（発生種：シュレイツメハダニ）

防除のポイント

・晩秋にかけて発生が多くなるので、発生ほ場では早期発見・防除を行う。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症