平成　31 年度　　10 月予報

作物	マンゴー	地域	八重山群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ		
予報	10 月の発生量（平年比）	並	
	9 月からの増減傾向	↗	
予報の根拠	9 月の発生量（平年比）	並	
	その他 (気象要因など)	平年の発生量の推移（↗）	

調査結果

今期と平年の推移





過去2年間の推移





防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

平成　31 年度　　10 月予報

作物	マンゴー		地域	八重山群島
病害虫名	② ハダニ類		シュレイツメハダニ	
予報	10 月の発生量（平年比）	やや多		
	9 月からの増減傾向	↗		
予報の根拠	9 月の発生量（平年比）	やや多		
	その他 (気象要因など)	平年の発生量の推移（↗）		

調査結果

今期と平年の推移



ハダニ類の発生推移

・雌成虫数(頭/葉)：3.33（前年0.00　平年0.10）

・一部ほ場で多発生

過去2年間の推移



ハダニ類の発生推移

防除のポイント

・晩秋にかけて発生が多くなるので、発生ほ場では早期発見・防除を行う。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症