平成　31 年度　　12 月予報

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ		
予報	12 月の発生量（平年比）	並	
	11 月からの増減傾向	→	
予報の根拠	11 月の発生量（平年比）	(発生なし)並	
	その他 (気象要因など)	平年の発生量の推移（→）	

調査結果

今期と平年の推移





過去2年間の推移





・見取り調査による発生施設率：0.0%（平年値：57.1%）

防除のポイント

・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。

多発した施設では、収穫後に薬剤による防除を行う。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

・不要な新梢は、施設外に除去する。

・

ナガエコミカンソウ

平成　31 年度　　12 月予報

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	② マンゴーハフクレタマバエ		
予報	12 月の発生量（平年比）	多	
	11 月からの増減傾向	→	
予報の根拠	11 月の発生量（平年比）	多	
	その他 (気象要因など)	平年の発生量の推移（→）	

調査結果

今期と平年の推移



過去2年間の推移



・新梢発生ほ場率：20%（5ほ場中1ほ場のみで確認された）
・被害新梢率：100%

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。
・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。

平成　31 年度　　12 月予報

作物	マンゴー		地域	宮古群島
病害虫名	③ ハダニ類			
予報	12 月の発生量（平年比）	並		
	11 月からの増減傾向	→		
予報の根拠	11 月の発生量（平年比）	並		
	その他 (気象要因など)	平年の発生量の推移（→）		

調査結果

今期と平年の推移



過去2年間の推移



・発生種：シュレイツメハダニ
・発生施設率：40.0%（平年値：20.8%）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。