令和　2 年度　　4 月予報

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ		
予報	4 月の発生量（平年比）	ー	
	3 月からの増減傾向	ー	
予報の根拠	3 月の発生量（平年比）	-	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今期と平年の推移



アザミウマ類の発生推移



チャノキイロアザミウマ(トラップ)の発生推移

・新梢数が基準に満たなかったため3月の見取り調査のデータなし
・トラップ調査の誘殺ほ場率：0.0%（平年値：42.9%）

防除のポイント

・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・多発した施設では、収穫後に薬剤による防除を行う。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
・不要な新梢は、施設外に除去する。

ナガエコミカンソウ

令和　2 年度　　4 月予報

作物	マンゴー		地域	宮古群島
病害虫名	マンゴーハフクレタマバエ			
予報	4 月の発生量（平年比）	-		
	3 月からの増減傾向	-		
予報の根拠	3 月の発生量（平年比）	-		
	その他 (気象要因など)			

調査結果

今期と平年の推移



マンゴーハフクレタマバエの発生推移

・新梢数が基準に満たなかったため3月の見取り調査のデータなし

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。

・不要な新梢は、ほ場外に除去する。

令和　2 年度　　4 月予報

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	① ハダニ類		
予報	4 月の発生量（平年比）	並	
	3 月からの増減傾向	↗	
予報の根拠	3 月の発生量（平年比）	並	
	その他 (気象要因など)	今後１か月の気温が平年より高い見込み	

調査結果

今期と平年の推移



過去2年間の推移



・発生種：シュレイツメハダニ
・発生ほ場率：40.0%（平年値：36.7%）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。