令和　2 年度　12 月予報

作物	マンゴー		地域	宮古群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ			
調査結果	11 月の発生量（平年比）	ー		
予報	11 月からの増減傾向	ー		
	12 月の発生量（平年比）	-		
予報の根拠				

調査結果

今年と平年の推移



アザミウマ類の発生推移



チャノキイロアザミウマ(トラップ)の発生推移

・新梢数が基準に満たなかったため11月の見取り調査データなし

防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

令和　2 年度　12 月予報

作物	マンゴー		地域	宮古群島
病害虫名	マンゴーハフクレタマバエ			
調査結果	11 月の発生量（平年比）	ー		
予報	11 月からの増減傾向	ー		
	12 月の発生量（平年比）	ー		
予報の根拠				

調査結果

今年と平年の推移



マンゴーハフクレタマバエの発生推移

・新梢数が基準に満たなかったため11月の見取り調査データなし

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。

令和　2 年度　12 月予報

作物	マンゴー		地域	宮古群島
病害虫名	① ハダニ類		シュレイツメハダニ	
調査結果	11 月の発生量（平年比）	並		
予報	11 月からの増減傾向	↗		
	12 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）		

調査結果

今年と平年の推移



過去2年の推移



・発生種：シュレイツメハダニ

・発生施設率：40%（平年値：26.0%）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症