平成　31 年度　　1 月予報

作物	マンゴー	地域	八重山群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ		
予報	1 月の発生量（平年比）	－	
	12 月からの増減傾向	－	
予報の根拠	12 月の発生量（平年比）	－	
	その他 (気象要因など)		

調査結果

今期と平年の推移





・新梢数が基準に満たなかったため、12月のデータなし

過去2年間の推移





防除のポイント

・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・出蕾・開花期における本種の増加を抑制するため、ビニール被覆前後に予防散布を行う。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
・不要な新梢は、施設外に除去する。

ナガエコミカンソウ

平成 31 年度　　1 月予報

作物	マンゴー		地域	八重山群島
病害虫名	マンゴーハフクレタマバエ			
予報	1 月の発生量（平年比）	ー		
	12 月からの増減傾向	ー		
予報の根拠	12 月の発生量（平年比）	ー		
	その他 (気象要因など)			

調査結果

今期と平年の推移



マンゴーハフクレタマバエの発生推移

・新梢数が基準に満たなかったため、12月のデータなし

過去2年間の推移



マンゴーハフクレタマバエの発生推移

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。

平成　31 年度　　1 月予報

作物	マンゴー	地域	八重山群島
病害虫名	① ハダニ類		
予報	1 月の発生量（平年比）	並	
	12 月からの増減傾向	→	
予報の根拠	12 月の発生量（平年比）	(発生なし)並	
	その他 (気象要因など)	平年の発生量の推移（→）	

調査結果

今期と平年の推移





過去2年間の推移





・発生ほ場率：00.0%（平年値：24.0%）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症