令和　2 年度　　5 月予報

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ		
予報	5 月の発生量（平年比）	並	
	4 月からの増減傾向	↗	
予報の根拠	4 月の発生量（平年比）	(発生なし)並	
	その他 (気象要因など)	平年の発生量の推移（↗） 新梢の発生量が増加するため	

調査結果

今期と平年の推移





過去2年間の推移





・関係機関より一部ほ場で多発情報あり
・見取り調査による発生施設率：0.0%（平年値：23.1%）

防除のポイント

・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・多発した施設では、収穫後に薬剤による防除を行う。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
・不要な新梢は、施設外に除去する。

ナガエコミカンソウ

令和　2 年度　　5 月予報

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	マンゴーハフクレタマバエ		
予報	5 月の発生量（平年比）	多	
	4 月からの増減傾向	↗	
予報の根拠	4 月の発生量（平年比）	多	
	その他 （気象要因など）	平年の発生量の推移（↗） 新梢の発生量が増加するため	

調査結果

今期と平年の推移



過去2年間の推移



・被害新梢率：54.7%

・発生施設率：100%（平年値：20.0%）

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。

・不要な新梢は、ほ場外に除去する。

令和　2 年度　　5 月予報

作物	マンゴー		地域	宮古群島
病害虫名	① ハダニ類			
予報	5 月の発生量（平年比）	並		
	4 月からの増減傾向	↘		
予報の根拠	4 月の発生量（平年比）	並		
	その他 (気象要因など)	平年の発生量の推移（↘）		

調査結果

今期と平年の推移



過去2年間の推移



・発生種：シュレイツメハダニ
・発生ほ場率：60.0%（平年値：54.0%）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。