令和　3 年度　　4 月予報

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ		
調査結果	3 月の発生量（平年比）	(発生なし)並	
予報	3 月からの増減傾向	→	
	4 月の発生量（平年比）	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移（→）	

調査結果

(見取り調査)　〈中央値〉



〈平均値〉



(トラップ調査)　〈中央値〉



〈平均値〉



防除のポイント

・開花期以降は本種が増加しやすいので、早期発見・防除に努める。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
・キダチコミカンソウなど、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・不要な新梢は、施設外に除去する。

ナガエコミカンソウ

令和　3 年度　　4 月予報

作物	マンゴー		地域	沖縄群島
病害虫名	① マンゴーハフクレタマバエ			
調査結果	3 月の発生量（平年比）	並		
予報	3 月からの増減傾向	→		
	4 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（→）		

調査結果

〈中央値〉



〈平均値〉



・ 発生施設率：16.7%（平年値：39.4%）

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。

・不要な新梢は、ほ場外に除去する。

令和　3 年度　　4 月予報

作物	マンゴー		地域	沖縄群島
病害虫名	② ハダニ類			
調査結果	3 月の発生量（平年比）	並		
予報	3 月からの増減傾向	↗		
	4 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）		

調査結果

〈中央値〉



〈平均値〉



- 発生種：シュレイツメハダニ、マンゴーツメハダニ
- 発生施設率：25%（平年値：26.9%）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症