令和　3 年度　　4 月予報

作物	マンゴー		地域	宮古群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ			
調査結果	3 月の発生量（平年比）	ー		
予報	3 月からの増減傾向	ー		
	4 月の発生量（平年比）	-		
予報の根拠				

調査結果

今年と平年の推移



・新梢数が基準に満たなかったため3月の見取り調査データなし
・トラップにおける発生施設率：40%（平年値：31.6%）

防除のポイント

・開花期以降は本種が増加しやすいので、早期発見・防除に努める。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
・キダチコミカンソウなど、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・不要な新梢は、施設外に除去する。

ナガエコミカンソウ

令和　3 年度　　4 月予報

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	① ハダニ類	シュレイツメハダニ	
調査結果	3 月の発生量（平年比）	並	
予報	3 月からの増減傾向	↗	
	4 月の発生量（平年比）	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）	

調査結果

今年と平年の推移



過去2年の推移



・発生施設率：20%（平年値：34.7%）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症