令和　3 年度　　5 月予報

作物	マンゴー		地域	八重山群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ			
調査結果	4 月の発生量（平年比）	ー		
予報	4 月からの増減傾向	ー		
	5 月の発生量（平年比）	ー		
予報の根拠				

調査結果

今期と平年の推移



チャノキイロアザミウマ（トラップ）の発生推移

過去２年間の推移



チャノキイロアザミウマ（トラップ）の発生推移

・新梢数が基準に満たなかったため4月の見取り調査データなし

防除のポイント

・開花期以降は本種が増加しやすいので、早期発見・防除に努める。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・不要な新梢は、施設外に除去する。

ナガエコミカンソウ

令和　3 年度　　5 月予報

作物	マンゴー		地域	八重山群島
病害虫名	① ハダニ類			
調査結果	4 月の発生量（平年比）	やや多		
予報	4 月からの増減傾向	→		
	5 月の発生量（平年比）	やや多		
予報の根拠		平年の発生量の推移（→）		

調査結果

今期と平年の推移



過去２年間の推移



・ 発生施設率：60%（平年値：25%）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症