令和　3 年度　　7 月予報

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ		
調査結果	6 月の発生量（平年比）	並	
予報	6 月からの増減傾向	↗	
	7 月の発生量（平年比）	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）	

調査結果

（見取り調査）　〈中央値〉



〈平均値〉



（トラップ調査）　〈中央値〉



〈平均値〉



防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。
・収穫期に発生の多かった施設では、せん定終了後に薬剤による防除を行う。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

令和　3 年度　　7 月予報

作物	マンゴー		地域	沖縄群島
病害虫名	② マンゴーハフクレタマバエ			
調査結果	6 月の発生量（平年比）	並		
予報	6 月からの増減傾向	↘		
	7 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↘）		

調査結果

〈中央値〉



マンゴーハフクレタマバエの発生推移

〈平均値〉



マンゴーハフクレタマバエの発生推移

・ 発生施設率：60.0%（平年値：55.4%）

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。

令和　3 年度　　7 月予報

作物	マンゴー		地域	沖縄群島
病害虫名	③ ハダニ類		シュレイツメハダニ	
調査結果	6 月の発生量（平年比）	並		
予報	6 月からの増減傾向	↗		
	7 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）		

調査結果

〈中央値〉



〈平均値〉



- 発生種：シュレイツメハダニ
- 発生施設率：25.0%（平年値：47.1%）

防除のポイント

・収穫終了後の防除を徹底する。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症