令和　3 年度　　8 月予報

作物	マンゴー		地域	沖縄群島
病害虫名	① マンゴーハフクレタマバエ			
調査結果	7 月の発生量（平年比）	並		
予報	7 月からの増減傾向	↗		
	8 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）		

調査結果

〈平年値〉



マンゴーハフクレタマバエの発生推移

〈中央値〉



マンゴーハフクレタマバエの発生推移

・ 発生施設率：66.7%（平年値：56.9%）

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。

令和　3 年度　　8 月予報

作物	マンゴー		地域	沖縄群島
病害虫名	② ハダニ類			
調査結果	7 月の発生量（平年比）	やや多		
予報	7 月からの増減傾向	↘		
	8 月の発生量（平年比）	やや多		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↘）		

調査結果

〈平年値〉



〈中央値〉



- 発生種：シュレイツメハダニ
- 発生施設率：42.9%（平年値：61.5%）
- 一部ほ場で多発生

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。

・不要な 、早い時期に除去する。

ハダニの寄生による葉のかすれ症