令和　3 年度　　8 月予報

作物	マンゴー		地域	八重山群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ			
調査結果	7 月の発生量（平年比）	ー		
予報	7 月からの増減傾向	ー		
	8 月の発生量（平年比）	ー		
予報の根拠				

調査結果

今期と平年の推移



チャノキイロアザミウマ（トラップ）の発生推移

過去２年間の推移



チャノキイロアザミウマ（トラップ）の発生推移

・発生施設率：75%（平年値：75%）

・新梢数が基準に満たなかったため、７月の見取り調査のデータなし

防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。

・収穫期に発生の多かった施設では、せん定終了後に薬剤による防除を行う。

・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

令和　3 年度　　8 月予報

作物	マンゴー		地域	八重山群島
病害虫名	① ハダニ類			
調査結果	7 月の発生量（平年比）	やや多		
予報	7 月からの増減傾向	↘		
	8 月の発生量（平年比）	やや多		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↘）		

調査結果

今期と平年の推移



過去２年間の推移



・ 発生施設率：50%（平年値：32%）

防除のポイント

・収穫終了後の防除を徹底する。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症