令和　3 年度　10 月予報

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	① チャノキイロアザミウマ		
調査結果	9 月の発生量（平年比）	やや少	
予報	9 月からの増減傾向	↗	
	10 月の発生量（平年比）	やや少	
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）	

調査結果

今年と平年の推移





過去2年間の推移



トラップ調査



・見取り調査による発生施設率：0.0%（平年値：72.9%）

防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

令和　3 年度　10 月予報

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	② ハダニ類	シュレイツメハダニ	
調査結果	9 月の発生量（平年比）	並	
予報	9 月からの増減傾向	↘	
	10 月の発生量（平年比）	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移（↘）	

調査結果

今年と平年の推移





過去2年の推移



トラップ調査



・発生種：シュレイツメハダニ

・発生施設率：20.0%（平年値：20.0%）

防除のポイント

・晩秋にかけて発生が多くなるので、発生ほ場では早期発見・防除を行う。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症