令和　3 年度　 11 月予報

作物	マンゴー		地域	宮古群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ			
調査結果	10 月の発生量（平年比）	並		
予報	10 月からの増減傾向	↘		
	11 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↘）		

調査結果

今年と平年の推移





過去2年間の推移





・見取り調査による発生施設率：40.0%（平年値：68.9%）

防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

令和　3 年度　11 月予報

作物	マンゴー		地域	宮古群島
病害虫名	マンゴーハフクレタマバエ			
調査結果	10 月の発生量（平年比）	やや多		
予報	10 月からの増減傾向	↘		
	11 月の発生量（平年比）	やや多		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↘）		

調査結果

今年と平年の推移



過去2年間の推移



・発生施設率40.0%（平年値：37.8%）

防除のポイント

・幼虫は、新葉から新梢の軸までの柔らかい組織内に潜行して食害し、成熟すると飛び出し、地面に落下して蛹化する。

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。

令和　3 年度　11 月予報

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	① ハダニ類	シュレイツメハダニ	
調査結果	10 月の発生量（平年比）	並	
予報	10 月からの増減傾向	→	
	11 月の発生量（平年比）	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移（→）	

調査結果

今年と平年の推移





過去2年の推移





・発生種：シュレイツメハダニ

・発生施設率：40.0%（平年値：20.8%）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症