令和　3 年度　　3 月予報

作物	マンゴー	地域	八重山群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ		
調査結果	2 月の発生量（平年比）	やや少	
予報	2 月からの増減傾向	―	
	3 月の発生量（平年比）		
予報の根拠			

調査結果

今期と平年の推移



過去２年間の推移



・発生施設率：20%（平年値：62%）

・新梢の数が基準以下のため、見取り調査のデータなし

防除のポイント

・開花期以降は本種が増加しやすいので、早期発見・防除に努める。

・開花中に薬剤散布を行う場合は、受粉昆虫に影響のない薬剤を選択する。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。

・不要な新梢は、施設外に除去する。

ナガエコミカンソウ

令和　3 年度　　3 月予報

作物	マンゴー		地域	八重山群島
病害虫名	① ハダニ類		シュレイツメハダニ	
調査結果	2 月の発生量（平年比）	並		
予報	2 月からの増減傾向	→		
	3 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（→）		

調査結果

今期と平年の推移



過去２年間の推移



・ 発生施設率：25%（平年値：22%）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症