令和　4 年度　　4 月予報

| 作物 | マンゴー | 地域 | 沖縄群島 |
|---|---|---|---|
| 病害虫名 | チャノキイロアザミウマ | | |
| 調査結果 | 3 月の発生量（平年比） | 並 | |
| 予報 | 3 月からの増減傾向 | ー | |
| | 4 月の発生量（平年比） | ー | |
| 予報の根拠 | | | |

調査結果

トラップ調査　（平均値と平年値）




（過去2年間の推移）




・発生施設率：75.0%（平年値：57.9%）

防除のポイント

・開花期以降は本種が増加しやすいので、早期発見・防除に努める。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・不要な新梢は、施設外に除去する。

ナガエコミカンソウ

令和　4 年度　　4 月予報

| 作物 | マンゴー | 地域 | 沖縄群島 |
|---|---|---|---|
| 病害虫名 | ① ハダニ類 | シュレイツメハダニ | |
| 調査結果 | 3 月の発生量（平年比） | 並 | |
| 予報 | 3 月からの増減傾向 | ↗ | |
| | 4 月の発生量（平年比） | 並 | |
| 予報の根拠 | | 平年の発生量の推移（↗） | |

調査結果

平均値と平年値




過去2年間の推移




過去2年間の発生施設率の推移




発生種：マンゴーツメハダニ

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症状