令和　4 年度　　4 月予報

作物	マンゴー	地域	八重山群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ		
調査結果	3 月の発生量（平年比）	並	
予報	3 月からの増減傾向	―	
	4 月の発生量（平年比）	―	
予報の根拠			

調査結果

今期と平年の推移



チャノキイロアザミウマ(トラップ)の発生推移

過去２年間の推移



チャノキイロアザミウマ(トラップ)の発生推移

・発生施設率：25%（平年値：72%）

・新梢の数が基準以下のため、見取り調査のデータなし

防除のポイント

・開花期以降は本種が増加しやすいので、早期発見・防除に努める。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。

ナガエコミカンソウ

令和　4 年度　　4 月予報

作物	マンゴー		地域	八重山群島
病害虫名	① ハダニ類			
調査結果	3 月の発生量（平年比）	並		
予報	3 月からの増減傾向	↗		
	4 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）		

調査結果

今期と平年の推移



過去２年間の推移



・ 発生施設率：25%（平年値：15%）

防除のポイント

・開花期以降は本種が増加しやすいので、早期発見・防除に努める。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

・コミカ園内外の雑草を除去する。

ハダニの寄生による葉のかすれ症状