令和　4 年度　　5 月予報

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ		
調査結果	4 月の発生量（平年比）	並	
予報	4 月からの増減傾向	ー	
	5 月の発生量（平年比）	ー	
予報の根拠			

調査結果

トラップ調査　（平均値と平年値）



（過去2年間の推移）



・発生施設率：100.0%（平年値：84.2%）

防除のポイント

・開花期以降は本種が増加しやすいので、早期発見・防除に努める。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・不要な新梢は、施設外に除去する。

ナガエコミカンソウ

令和　4 年度　　5 月予報

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	① ハダニ類	シュレイツメハダニ	
調査結果	4 月の発生量（平年比）	並	
予報	4 月からの増減傾向	↗	
	5 月の発生量（平年比）	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移（↗）	

調査結果

雌成虫数　（平均値と平年値）



（過去2年間の推



（発生施設率の推移）



発生種：シュレイツメハダニ、マンゴーツメハダニ

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症