令和　4 年度　　5 月予報

作物	マンゴー	地域	宮古群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ		
調査結果	4 月の発生量（平年比）	並	
予報	4 月からの増減傾向	―	
	5 月の発生量（平年比）	―	
予報の根拠			

調査結果

今期と平年の推移



過去2年間の推移



・トラップ調査による発生施設率：80.0%（平年値：40.0%）

防除のポイント

・開花期以降は本種が増加しやすいので、早期発見・防除に努める。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・不要な新梢は、施設外に除去する。

ナガエコミカンソウ

令和　4 年度　　5 月予報

作物	マンゴー		地域	宮古群島
病害虫名	① ハダニ類		シュレイツメハダニ	
調査結果	4 月の発生量（平年比）	並		
予報	4 月からの増減傾向	↘		
	5 月の発生量（平年比）	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↘）		

調査結果

今期と平年の推移



過去2年の推移



・発生施設率：60.0%（平年値：48.0%）

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症状