

中部保健所管内 感染症発生動向調査情報

2025/8/25 ~ 2025/8/31

発 令 中 の 注 意 報	県 全 体	〈警報〉	伝染性紅斑	〈注意報〉	なし
	各 保 健 所	警報	中部保健所：伝染性紅斑 八重山保健所：伝染性紅斑		
		注意報	中部保健所：なし		

『伝染性紅斑（リンゴ病）』【警報発令中】

- 感染経路：飛沫感染、接触感染
頬に発しんが出現する7～10日くらい前に、微熱やかぜのような症状がみられ、この時期にウイルスの排出が最も多くなります。発しんが現れたときにはウイルスの排出はほとんどなく、感染力もほぼ消失しています。
- 主な症状：約10～20日の潜伏期間の後、微熱やかぜの症状などがみられ、その後、両頬に蝶の羽のような境界鮮明な赤い発しん（紅斑）が現れます。続いて、体や手・足に網目状やレース状の発しんが広がりますが、これらの発しんは1週間程度で消失します。
- 感染対策：手洗い、マスク着用などの咳エチケットの実施
紅斑が出ている時期にはほとんど感染力がないため、かぜ症状のある人はこまめな手洗いや、せきやくしゃみをする時には口と鼻をハンカチ等でおおうなどの「咳エチケット」を心がけることが大切です。

『レプトスピラ症』に気を付けましょう

- レプトスピラ症は人畜共通感染症です。ネズミなどの野生生物や家畜、イヌなどが保菌状態となり、尿中に菌を排出します。汚染された水や土壌、あるいは尿がヒトの皮膚の傷、粘膜を通して感染します。また、汚染された水や食物の飲食による経口感染もあります。
- 雨が降ったあとの河川や池などの水環境、野生動物が生息する畑周辺などは注意が必要です。
- 県内の河川で遊泳等した方が感染し発症するケースが増えています。

『中部保健所管内で麻しん（はしか）の患者が報告されています！』

- 今般、国内においても、麻しん（はしか）陽性者が多数報告されています。今後、県外、海外からの持ち込みや感染拡大が懸念されています。
- 感染経路：空気感染、飛沫感染、接触感染
- 主な症状：感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水などの風邪のような症状（カタル症状）が現れます。2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現するといわれています。
- 予防方法：麻しんは予防接種で防げる病気であり、予防接種は最も有効な予防方法です！！麻しん風しん混合ワクチン（MRワクチン）は、『2回』接種することで十分な免疫を獲得することができます。定期接種対象者（1歳児、小学校入学前1年間の幼児）は、接種歴を確認し、未接種の場合は早めに予防接種を受けましょう。

■ 感染症の発生動向 1 類～5 類（全数把握）

		県全体	うち中部
1 類	なし		
2 類	結核	9	5
3 類	なし	2	0
4 類	なし	0	0
5 類	後天性免疫不全症候群（H I V 感染症を含む）	1	0
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	3	1
	侵襲性肺炎球菌感染症	3	1
	梅毒	1	0
	百日咳	6	2

■ 感染症の定点当たり報告数


※直近 5 週間で報告された感染症のみ

	31週		32週		33週		34週		35週	
	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県
インフルエンザ	2.62	3.93	3.15	3.93	3	3.64	4.46	2.76	2.69	2.29
RSウイルス感染症	1.43	1.56	2	1.68	1	1	0.29	0.8	2.43	1.12
咽頭結膜熱	1.14	0.52	1	0.4	2.14	0.64	1.14	0.68	1.43	0.56
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.29	2.12	0.86	0.8	1.29	1.08	1	0.84	1.43	1.24
感染性胃腸炎	2.14	4.12	4.57	4.84	1.57	2.76	1.57	4.76	2.71	3.76
水痘	0.71	0.24	0.29	0.12	0.14	0.12	0.57	0.44	0.14	0.12
手足口病	0.71	0.6	1.29	0.92	0.71	0.52	0.86	0.68	1.86	1
伝染性紅斑	5	1.84	5	2	2.43	1.16	2.86	1.56	3.29	1.44
突発性発疹	0.57	0.36	0.71	0.44	0.57	0.36	0.57	0.4	0.57	0.4
ヘルパンギーナ	0.14	0.28	0.29	0.2	0.57	0.28	0.29	0.2	0.14	0.28
流行性耳下腺炎	0.14	0.08	0	0.08	0	0	0.14	0.12	0	0.04
急性出血性結膜炎	0	0	0	0.22	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	3.67	1.5	2.11	2	2.78	6	3.67	6	4.89
無菌性髄膜炎	0	0.14	0.5	0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
COVID-19	16.23	12.73	13.46	10.42	8.54	8.42	7.38	8.2	6.92	6.51


警報

注意報

■ 中部保健所管内の直近5週間の主な感染症の推移（10万人当たり患者数）



■ インフルエンザの過去5年の発生動向



■ 新型コロナウイルス感染症

